

Forêt de Bois-d'Arcy, 24 octobre 2009, 65 espèces		Commune : Bois-d'Arcy		MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe Pezizomycetideae					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
9,2	<i>Lanzia echinophila</i> (Bulliard:Fr.)Korf	Phialée des bogues		bogue de châtaigne	
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne		chêne	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau, souchette			
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes		chêne	
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
612	<i>Mycena speirea</i> (Fr.:Fr.)Gillet	Mycène en petits groupes			
Ordre : Agaricales					
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
675,5	<i>Lepiota ignicolor</i> Bres.	Lépiote couleur de feu			Spores 6x3,5 µm
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliote solitaire			Odeur anisée
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
882	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagnesi	Plutée saturé			Spores 6-8x5,5-6 µm. Chapeau brun fauve hygrophone, marge striée. Cystides utrifomes
Ordre : Cortinariales					
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			Spores 6x3,5 µm
1288	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
Ordre : Boletales					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir		pin	
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet des chênes		chêne	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. K	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			