

Forêt de Rambouillet, Etang d'Or, 18 septembre 2011, 122 espèces		Commune : Rambouillet		MEN : 2215C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Ceratomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
28,6	<i>Peziza succosa</i> Berkeley	Pézize à lait jaune			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptoccephalus</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
134	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr. : Fr.) Kühner	Lentin couleur d'ours			
239	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Hygrophore des bois			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc	<i>stiparophyllum</i>		
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades		Pelouse	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
508	<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers.:Fr.)Singer	Marasme pâle			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
Ordre : Agaricales					
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
749	<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	Agaric orné		Pelouse	
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliote solitaire			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
Ordre : Amanitales					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
842,5	<i>Amanita franchetii</i> (Boudier) Fayod	Amanite à voile jaune			
844	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini)Quélet	Amanite épineuse			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
859	<i>Pluteus tricuspidatus</i> Velenovsky	Plutée à arêtes noires	<i>nigrofloccosus, atromargin</i>	pin	
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
882	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagnesi	Plutée saturé			Chapeau brun saturé
892	<i>Pluteus diettrichii</i> Bresadola	Plutée rimuleux			Spore Q=1,5-1,6 ; cuticule hymeniforme
Ordre : Entolomatales					
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>sinuatum</i>		
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Housknecht & Noordeloos				Chapeau gris beige
974,5	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch) Singer	Rhodocybe tacheté			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
980	<i>Alnicola bohemica</i> (Vel.) Kühner & Maire 1935	Alnicole de Bohême			cystides cylindriques capitées (non becquées)
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radican			
1028,5	<i>Inocybe incarnata</i> Bresadola		<i>piriodora</i> var. <i>incarnata</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1129	<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire armillé		bouleau	
1156,5	<i>Cortinarius olivus</i> Lge 1935	Cortinaire puant			pied un peu bulbeux à bracelets
1163	<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> R. Henry ex Orton 1960	Cortinaire brun violet			probable
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1166,5	<i>Cortinarius infractus</i> var. <i>olivellus</i> (Moser) Nespiak	Cortinaire à marge brisée			Chapeau vert
1176,5	<i>Cortinarius dibaphus</i> var. <i>nemorosus</i> (Henry)Henry	Cortinaire à deux couleurs (var. des feuillus)			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant			
1188,5	<i>Cortinarius odoratus</i> (Joguet ex Moser) Moser	Cortinaire odorant			verdâtre, odeur d'eau de fleurs d'oranger
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1230	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.:Fr.)Scherffel, non Pers.	Naucorie hérisson			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1392	<i>Russula sanguinaria</i> (Schumacher)Rauschert	Russule sanguine		pin	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1418	<i>Russula violeipes</i> Quélet. 1898	Russule à pied violet			
1494	<i>Russula risigallina</i> f. <i>luteorosella</i> (Britzelmayr)Bon	Russule caméléon			
1518	<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar 1968	Lactaire à odeur de citron			
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison		bouleau	
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		chêne	
1555	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair 1950	Lactaire semi-sanguin		pin	
1561	<i>Lactarius flavidus</i> Boudier	Lactaire jaune à lait violet			
1566	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, L. non zoné	<i>L. fuliginosus</i> var. <i>albipes</i>		
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1618	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeffer : Fr.) Miller	Gomphide visqueux		pin	
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoiisi			
1643	<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet granulé		pin	
1644	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.)Kuntze	Bolet à mycélium rose		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1655	<i>Xerocomus porosporus</i> Imler	Bolet fissuré			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1683	<i>Boletus queletii</i> Schulzer	Bolet de Quélet			
1685	<i>Boletus luridus</i> Sch.:Fr.	Bolet blafard			
1697	<i>Boletus satanas</i> Lenz 1831	Bolet satan			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		charme	
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Watling	Bolet craquelé			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			