

Forêt de Bois-d'Arcy, 23 juin 2012, 36 espèces		Communes : Bois-d'Arcy et Les Clayes-sous-Bois		MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>MYXOMYCETES</b>					
0,1	<i>Ceratomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
0,1	<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch)Gmelin	Tubifère couleur rouille			
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique		Frêne	
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe			
7,4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte			
7,8	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann:Fr.)Karsten	Leptosphère pointu		Ortie	
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse			Hyménium se tachant de jaune au toucher
81,6	<i>Ganoderma adpersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme épaissi			
95,5	<i>Funalia gallica</i> (Fr.:Fr.)Bondartsev & Singer	Tramète des Gaules	<i>Corioloopsis gallica</i>	Frêne	
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal		Rubus	Spores 7 x 5 µm
<b>Ordre : Agaricales</b>					
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Gênevier	Psalliote jaunissante		herbe	
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		Spores mitriformes 7 x 5 µm
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa var. spissa</i>	chêne	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			Cystides à crochets
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre			Spores 7,5 x 6 µm
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
1083	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet 1883	Inocybe à pied blanc			Spores bosselées 9 x 7 µm, pied clair poudré, chapeau jaune ocracé, cystides fusiformes metuloïdes
1238	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Crépidote aplani			Spores sphériques 6 µm. Chapeau blanc puis ocre. Lames longtemps blanches.
<b>Ordre : Russulales</b>					
1412,5	<i>Russula heterophylla</i> f. <i>adusta</i> Lange	Russule verte		chêne	Forme brune
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1489	<i>Russula lilacea</i> Quélet. 1876	Russule lilas		charme	Spores echinulées 8 x 6,5 µm
<b>Ordre : Boletales</b>					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		charme	
<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>					
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			