

Bois d'Arcy, Bois Senon et plaine de la Croix Bonnet, 10 novembre 2012, 48 espèces				Commune : Bois d'Arcy	MEN : 2214D	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Lieu	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>						
<b>Classe : Pezizomycètes</b>						
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	BS & CB	
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Pézize orangée			CB	
41	<i>Melastiza chateri</i> (W. G. Smith) Boudier 1907	Fausse pézize orangée			CB	Spores -> 19 µm, paraphyses élargies au sommet
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>						
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>						
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			CB	
52	<i>Exidia nucleata</i> (Schw. : Fr.) Burt 1921	Exidie à noyau			CB	
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>						
<b>Sous-classe : Aphyllorphomycetideae</b>						
62	<i>Merulioopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		CB	
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			CB	
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse			BS	
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel			CB	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			CB	
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>						
<b>Ordre : Tricholomatales</b>						
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		CB	
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			BS	
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			BS	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			CB	
398	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt:Fr.)Jacobash	Tricholome ceinturé		saule	CB	
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			BS	
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			CB	
<b>Ordre : Agaricales</b>						
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		CB	Spores mitriformes 7,5 x 6 µm
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		CB	
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		BS & CB	
<b>Ordre : Amanitales</b>						
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	CB	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			CB	
<b>Ordre : Pluteales</b>						
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & E	Volvaire visqueuse		pelouse	CB	
<b>Ordre : Cortinariales</b>						
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé		saule	CB	
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			CB	
997	<i>Hebeloma leucosarx</i> Orton	Hébélome à chair blanche		saule	CB	Lames denticulées : non cité dans littérature
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		CB	Spores 12 x 6-7 µm, pas de cystides
1020	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel		saule	CB	Spores 8-9 x 5,5 µm, pas de cystides
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			BS & CB	
1073	<i>Inocybe curvipes</i> Karsten 1890	Inocybe variable		saule	CB	Spores polygonales 10-13,5 x 7,5 µm, Cystides fusiformes, ventruës 50x20 µm, odeur terreuse
1137	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de faon			CB	Odeur terreuse
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale			CB	Spores 9-10 x 5,5 µm, cheilocystides en spatules
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			CB	
1243,5	<i>Crepidotus caspari</i> Velenovský		<i>autochtonus, fragilis</i>		CB	Spores 8,5 x 6 µm, basides 24x7, sterigmates longs 3-6
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse		pelouse	CB	
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		BS & CB	
1270	<i>Stropharia inuncta</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Strophaire porphyre		pelouse	CB	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			CB	
<b>Ordre : Russulales</b>						
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile		bouleau	CB	
1376,5	<i>Russula knautii</i> (Sing.) Kühner et Romagnesi ex Hora	Russule fragile à centre noir	<i>R. fragilis</i> var. <i>knautii</i>	bouleau	CB	
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers		saule	CB	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	CB	
1573	<i>Lactarius glyciosmus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de noix de coco		bouleau	CB	Odeur de coco
<b>Ordre : Boletales</b>						

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Lieu	Remarques
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		bouleau	CB	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	CB	
1710	<i>Leccinum roseofractum</i> Watling 1968	Bolet rude à chair rose		bouleau	CB	
	<b>Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i></b>					
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux		chêne	CB	Spores rondes 10 µm
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel &	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		BS	