

Relevé mycologique

Forêt de Rambouillet, Etangs de Hollande, 20 octobre 2013			64 espèces	MEN : 2215A	Commune : Les Bréviaires
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Pezizomycètes					
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver				
30	<i>Otidea onotica</i> (Pers. : Fr.) Fuckel	Oreille de lièvre			
30,1	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee 1895	Otidée sombre			
30,1	<i>Otidea umbrina</i> (Pers.) Pers 1898	Otidée sombre			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
118	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
138	<i>Lentinus cyathiformis</i> (Schaeffer->) Bresadola	Lentin en coupe	<i>L. degener, Neolentinus schaefferi</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laq	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
370	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet 1872	Tricholome disjoint			
407	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
553	<i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode	<i>M. iodolens ; M. vitilis</i> ss. auct.		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
Ordre : Agaricales					
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & L.	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Génevier	Agaric jaunissant			
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>		
Ordre : Amanitales					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
842,5	<i>Amanita franchetii</i> (Boudier) Fayod	Amanite à voile jaune	<i>aspera</i>		
842,5	<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulfurea</i> Gillet	Amanite rougissante variété à anneau jaune			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
Ordre : Russulales					
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1350	<i>Russula delica</i> Fr.	Russule sans lait			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	

Relevé mycologique

1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1527	<i>Lactarius acerrimus</i> Britzlemayr 1893	Lactaire à lames interveinées, Lactaire très âcre		
1542	<i>Lactarius vietis</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		
1590	<i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch)Gillet	Lactaire à odeur de punaise		charme
1601	<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire fuligineux, Lactaire enfumé		
	Ordre : Boletales			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été		
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		
	Sous-classe : Gasteromycetideae			
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		