

Forêt de St-Germain, gare d'Achères , 12 octobre 2014, 37 espèces			Commune : Saint-Germain-en-Laye	MEN : 2213D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant		souche	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu			
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptcephalus, Melanopus varius</i>		
107	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schweiniz	Polypore bai	<i>P. durus, Melanopus picipes</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
135	<i>Lentinus torulosus</i> (Pers. : Fr.) Lloyd	Lentin coquillage	<i>Panus conchatus, P. flabelliformis</i>		
157	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer	Pleurote terrestre	<i>Acanthocystis geogenius</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>	feuille de chêne	
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
511	<i>Micromphale foetidum</i> (Sowerby:Fr.)Gray	Marasme fétide			Odeur de chou pourri
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	<i>Collybia conigena</i>	sur cônes de pin	
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p., O. longipes</i>		
Ordre : Agaricales					
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
Ordre : Amanitales					
844	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini)Quélet	Amanite épineuse			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Cortinariales					
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Boletales					
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	pin	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes			
1719	<i>Geastrum sessile</i> (Sowerby) Pouzar	Géastre sessile			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		