

Forêt de Bois-d'Arcy, 1er novembre 2014, 106 espèces		Commune : Bois-d'Arcy		MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycètes					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée			
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre	<i>Stereum purpureum</i>		
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme méridional	<i>G. australe</i>		
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
299	<i>Clitocybe phaeoophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de pouaille	<i>hydrogramma</i>		
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
391,5	<i>Tricholoma squarrulosum</i> Bres.	Tricholome à pied écailléux			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau, so	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> <i>C. marasmioides</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée	<i>M. gracilentia</i>		
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
758	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin à poils jaunes	<i>Parasola auricoma</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			

871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>	
892	<i>Pluteus diettrichii</i> Bresadola	Plutée rimuleux	<i>Pluteus rimulosus</i>	
	Ordre : Entolomatales			
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>	
920	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.)Moser	Entolome à pied hérissé	<i>Rhodophyllus mammosus</i>	Odeur d'huître
929	<i>Entoloma cetratum</i> (Fr.:Fr.)Moser	Entolome ocellé		
	Ordre : Cortinariales			
983,5	<i>Alnicola umbrina</i> (Maire) Kühner	Alnicole commune		aulne Spores 11-14 x 6 µm
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé		
1001	<i>Hebeloma sacchariolum</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée		
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant		
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigé	<i>I. rimosa</i>	
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>	
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe		
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté	<i>flexipes</i>	Odeur de Pelargonium
1139,5	<i>Cortinarius eucaeruleus</i> Rob. Henry 1989	Cortinaire bleu	<i>C. caeruleus var. depallens</i>	
1183,5	<i>Cortinarius subfulgens</i> P D Orton 1960	Cortinaire voisin de <i>fulgens</i>	<i>C. olearioides</i>	
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>	
1204,5	<i>Cortinarius mucifluoides</i> Hy.		<i>pseudosalor</i>	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		
1228,5	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H.Smith & Singer			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante		
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse		
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		
	Ordre : Russulales			
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante		
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica var. silvestris</i>	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		
1410	<i>Russula langei</i> Bon 1970			à confirmer
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante		
1440	<i>Russula melzeri</i> Zvara 1927	Russule tache-de-sang, Russule de Melzer		à confirmer
1476	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvara	Russule de Velenovský		
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		chêne
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant		
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactaire	<i>Lactarius fuliginosus var. albipes</i> (Lange) Bon	
	Ordre : Boletales			
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoisi	<i>Boletus cramesinus</i>	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux		
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		ou <i>pruinatus</i>
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge		
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet des chênes		chêne
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		charme
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau
	Sous-classe : Gasteromycetideae			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>	
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe		
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Person) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de p	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>	