

Etang du Moulin à Renard, 25 juin 2016		53 espèces	Commune : Guyancourt		MEN : 2215B
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
MYXOMYCETES					
0.1	<i>Arcyria obvelata</i> (Oeder) Onsberg		<i>A. nutans</i>		
0.1	<i>Fuligo septica</i> (L.) Wiggers	Suie putréfiée			
0.1	<i>Fuligo septica</i> var. <i>candida</i> (Pers.) R.E.Fries	Suie putréfiée			
0.1	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.) Macbr.				
0.1	<i>Lamproderma scintillans</i> (Berkeley & Broome) Morgan				
0.1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Lait de loup			
0.1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
0.1	<i>Physarum bivalve</i> Pers. 1795				
0.1	<i>Enteridium lycoperdon</i> (Bulliard) Farr	Réticulaire fausse vess	<i>Reticularia lycoperdon</i>		
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
6.5	<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Xylaire à long pied			
Classe : Leotiomycetes					
11.6	<i>Hymenoscyphus albidus</i> (Bull.:Fr.) Gray		<i>Helotium a.</i>	Pétiole de frêne	Spores en forme de banane
Classe : Pezizomycetes					
28.6	<i>Peziza succosa</i> Berkeley	Pézize à lait jaune	<i>Galactinia succosa</i>		Spores verruqueuses
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycetes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Wettstein	Oreille de judas		chêne	
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.) Pers.	Oreille mésentérique			
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.) Fr.	Stérée hirsute			
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.) Pouzar	Stérée pourpre	<i>Stereum purpureum</i>		
79.4	<i>Inonotus dryadeus</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Polypore du chêne		chêne	
79.5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schradler:Fr.) Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80.4	<i>Phellinus robustus</i> (Karsten) Bourdot & Galzin	Faux amadouvier		chêne	
80.7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schradler:Fr.) Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
82.5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.) Murr.	Polypore soufré			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.) Fr.	Dédalée du chêne		chêne	
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas	<i>Coriolus abietinus</i>	pin	
100.5	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Polypore amer	<i>Oligoporus stypticus</i>	conifère	
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe en entonnoir			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.) Fr.	Marasme petite roue			
512	<i>Collybia inodora</i> (Patouillard) Orton	Marasme inodore	<i>Micromphale rufoc</i>	chêne	Sur tronc
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.) Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.) Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.) Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.) Fr.	Amanite fauve			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.) S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.) Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
Ordre : Cortinariales					
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer) Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		Spores 11 x 6,5 µm, pas de cystides
1074	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Inocybe laineux	<i>I. ovatocystis</i>		
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées		charme	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1358	<i>Russula pectinata</i> (Bull. ex St.Am.) Fr.	Russule peignée			
1422.5	<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Kuyp. & van Vuure 1985	Russule vert olivacé		chêne	Gaiac faible sur pied, nul sur lames, chapeau vert
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->) Fr.	Russule grise			
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire camphré			
Ordre : Boletales					
1623	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bulliard : Fr.) Quélet	Bolet châtaigne		châtaignier, chêne	
1651	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Schaeffer) Bon	Bolet ferrugineux	<i>X. lanatus</i>		Pores jaune vif, pied grossièrement réticulé, spores très allongées
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quélet	Bolet à chair jaune			
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.) Karsten	Bolet amer, Chicotin			
1704	<i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer ex Kalchbr.) Singer	Bolet rude des trembles, Bolet des peupliers		peuplier	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1740	<i>Crucibulum laeve</i> (Hudson) Kambly	Crucibule lisse			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.) Willdenow	Cyathe strié			
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			