

Forêt de Beynes, 12 octobre 2019, 65 espèces		Commune : Beynes		MEN : 2214C	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Ceratiomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe			
Classe : Leotiomycetes					
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver				
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
81,7	<i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier	Ganoderme résineux			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
278	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagnesi	Clitocybe côtelé	<i>Infundibulicybe c.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
299	<i>Clitocybe phaeoptalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> <i>C. marasmioides</i>		
552	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Mycène corticole bleue			
562	<i>Mycena capillaripes</i> Peck	Mycène à pied chevelu			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p., O. longipes</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées	<i>L. metulaespora, magnispora</i>		
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
677	<i>Lepiota grangei</i> (Eyre)Kühner	Lépiote à squames olivacées			
680,5	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange, non ss Huijsman				
685,5	<i>Lepiota setulosa</i> Lge.		<i>L. minuta</i>		
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracie	<i>M. rickenii</i>		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & La	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Gênevier	Agaric jaunissant			
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
808	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeffer ->Kummer)Singer	Psathyrelle couleur chair			
Ordre : Amanitales					

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
968.5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos				
	Ordre : Cortinariales				
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1185	<i>Cortinarius splendens</i> R. Henry1939	Cortinaire splendide, Cortinaire jaune d'œuf			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiotte à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	pin	
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735.5	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.				
1735.7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	vesse-de-loup épineuse			