

Forêt de Beynes, 20 novembre 2022, 78 espèces		Commune : Beynes		MEN : 2214C	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Erysiphomycetes (oidiums)					
1	<i>Phyllactinia guttata</i> (Wallroth) Lévillé	Oïdium du noisetier	<i>Erysiphe coryli</i>	noisetier	
1	<i>Sawadaea bicornis</i> (Wallroth) Homma	Oïdium de l'érable	<i>Erysiphe aceris</i>	Acer campestre	
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
20	<i>Helvella lacunosa</i> Afz.:Fr.	Helvelle lacuneuse			
21	<i>Helvella elastica</i> Bulliard:Fr.	Helvelle élastique	<i>Leptopodia e.</i>		
28,3	<i>Peziza varia</i> (Hedwig : Fr.) Fr.	Pézize variée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Pucciniomycetes (rouilles)					
46,9	<i>Puccinia caricina</i> de Candolle			Carex sylvaticus.l.	
46,9	<i>Puccinia lapsanae</i> Fuckel			Lapsana communis	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
63	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrader) Nakasone & Burdsall	Mérule tremblante	<i>Merulius tremellosus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum gausapatum</i> (Fries) Fries				
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
264	<i>Hygrophorus glutinifer</i> Fries	Hygrophore dicoloré	<i>H. persoonii</i> , <i>H. dichrous</i>		
275	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bulliard) Harmaja	Tête de moine	<i>Clitocybe geotropa</i>		
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
290	<i>Atractosporocybe inornata</i> (Sowerby) P. Alvarado,	Clitocybe à odeur de poisson	<i>Clitocybe inornata</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	<i>C. cerussata</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>C. hydrogramma</i> , <i>Singerocybe phaeophthalma</i>		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			Odeur désagréable
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			Odeur désagréable de gaz d'éclairage
391	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Cooke) Saccardo	Tricholome squameux			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
485	<i>Lyophyllum rancidum</i> (Fr.:Fr.)Donk	Collybie à odeur rance	<i>Tephroclybe rancida</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
534	<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Collybia peronata</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue-de-souris	<i>Collybia conigena</i>	sur cônes de pin	
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouz	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Gênevier	Agaric jaunissant			
756	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade	<i>A. meleagris</i> , <i>A. praeclaresquamosus</i>		
776	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fries) Redhead, Vilgalys & M	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinus lagopus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & M	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
790	<i>Parasola conopilus</i> (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	<i>Psathyrella conopilus</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
Ordre : Amanitales					
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	syn. avec <i>luteovirens</i> est récente		
	Ordre : Entolomatales				
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à pied grèle	<i>E. leptopus</i> , <i>E. mammosum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
1105,5	<i>Cortinarius acutispissipes</i> Henry		<i>C. geophilus</i>	hêtre	(groupe <i>alboviolaceus</i>) Spores 8,5-9x5,7 µm, chapeau gris lilas à centre un peu ochracé. pied s.l.
1138	<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire brun			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noircissante			
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1403	<i>Russula veterosa</i> Fr.	Russule rose bonbon, Russule languissante	<i>R. schiffneri</i>	hêtre	Saveur acre, chapeau rose à disque jaune. Lames ocre.
1478	<i>Russula laeta</i> J. Schaeffer	Russule gaie	<i>R. borealis</i>		Chapeau 6 cm pourpre cuivré, lames jaunes, chair douce, Fe orange sale. Gaïac vif
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé			
1683	<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi	Bolet de Quélet	<i>Boletus queletii</i>		
1707	<i>Leccinellum crocipodium</i> (Letellier) Della Maggiora	Bolet craquelé	<i>Leccinum crocipodium</i>	chêne	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1733	<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeffer) Vizzini	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i> , <i>Morganella pyriformis</i>		
1740	<i>Crucibulum crucibuliforme</i> (Scopoli) V.S. White	Crucibule lisse	<i>Crucibulum laeve</i>		