

Lieu	Etang de la Tour (vases exondées)				
Commune	Vieille-Eglise-en-Yvelines (78)				
Date d'observation	08.09.2020				
Observateurs	Gérard ARNAL, Vincent FIALA, Jean PRIEUR				
Taxon (Taxref 7)	Nom commun	Rareté IDF 2020 (CBNBP)	Cotation UICN IDF (CBNBP)	Protection nationale ou régionale	Déterminant ZNIEFF 2020 (CBNBP)
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	CCC	LC		
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	CCC	LC		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau	C	LC		
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane	CC	LC		
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche couchée	C	LC		
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident à fruits noirs	AR	NA		
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	Bident rayonnant	RRR	VU	PR	x
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident à feuilles tripartites	AC	LC		
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	CCC	LC		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	CCC	LC		
<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Souchet brun	R	LC		
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Panic pied-de-coq	CC	LC		
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	Scirpe à inflorescence ovoïde	RRR	EN		x
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	Epilobe cilié	AR	NA		
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Epilobe hérissé	CCC	LC		
<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Vergerette du Canada	CCC	NA		
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	C	LC		
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Cotonnière des fanges	C	LC		
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	CCC	LC		
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux-acore	CC	LC		
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux	AR	LC		
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	CCC	LC		
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle	C	NA		
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Cotonnière blanc-jaunâtre	RR	EN		x
<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch,	Chenopode à nombreuses graines	C	LC		
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais	C	LC		
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycope d'Europe	CC	LC		
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb, 1967	Salicaire pourpier d'eau	AR	LC		
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	CC	LC		
<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire Camomille	CC	LC		
<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	C	LC		
<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	Myosotis à fleurs lâches	R	LC		
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Oenanthe aquatique	AR	LC		
<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode rouge	AR	LC		
<i>Panicum miliaceum</i> L., 1753	Panic faux-millet	RR	NA		
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée poivre d'eau	C	LC		
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	C	LC		
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire	CCC	LC		
<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852	Renouée fluette	RR	VU		x
<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937	Plantain intermédiaire	AC	LC		
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CCC	LC		
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante	CCC	LC		
<i>Potentilla supina</i> L., 1753	Potentille couchée	RR	VU	PR	x
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	CCC	LC		
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Renoncule sarde	AC	LC		
<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate	C	LC		
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	C	LC		
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe faux-cresson	AR	LC		

<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Oseille à feuilles obtuses	CCC	LC		
<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	Oseille maritime	R	LC		X
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	CC	LC		
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	CC	LC		
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée	C	LC		
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon du Cap	AC	NA		
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	CCC	LC		
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire glauque	AR	LC		
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère	CCC	LC		
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	CCC	LC		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude	CCC	LC		
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron maraîcher	CCC	LC		
<i>Taraxacum ruderalia</i> (Groupe)	Pissenlit commun (Groupe)	CC	NA		
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	CCC	LC		
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle blanc	CCC	LC		
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie	CCC	LC		

Répartition des taxons selon leur indice de rareté en Ile de France

(source Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien)

RRR	Extrêmement rare en IDF	2	3,1%		
RR	Très rare en IDF	4	6,2%		
R	Rare en IDF	3	4,7%		
AR	Assez rare en IDF	8	12,5%		
AC	Assez commun en IDF	4	6,2%		
C	Commun en IDF	13	20,3%		
CC	Très commun en IDF	9	14,1%		
CCC	Extrêmement commun en IDF	21	32,8%		
	Total relevé	64			

Cotation UICN: espèces vulnérables (**VU**), en danger (**EN**), préoccupation faible (**LC**), cotation non applicable (**NA**)

PR: Protection régionale

X: Déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)

--	--	--	--	--	--

