

| Forêt départementale d'Abbecourt (78) au sud d'Orgeval, 14 octobre 2007 | | MEN : 2214A | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 79 espèces | | | |
| N° CD | Espèce | Nom français | Habitat |
| Sous-DIVISION ASCOMYCOTINA, Sous-classe Pyrenomycetidae | | | |
| 7 | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville | Xylaïre du bois | |
| 7.4 | <i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr. | Diatrype en croûte | |
| Sous-classe Pezizomycetidae | | | |
| 10 | <i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al. | Chorosplénium bleu-vert | |
| Sous-DIVISION BASIDIOMYCOTINA | | | |
| Classe : Pucciniomycetes (rouilles) | | | |
| | <i>Puccinia arenariae</i> | | feuilles de <i>Silene latifolia</i> |
| Classe : Microbotryomycetes | | | |
| | <i>Microbotryum violaceum</i> | | anthères de <i>Silene latifolia</i> |
| Classe : Phragmobasidiomycètes | | | |
| 49 | <i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr. | Trémelle mésentérique | <i>Peniophora</i> |
| Classe : Homobasidiomycètes, Sous-classe : Aphyllophoromycetidae | | | |
| 66 | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr. | Stérée hirsute | |
| 66.5 | <i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schweinitz) Ellis (= <i>rameale</i>) | | |
| 87 | <i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr. | Dédalée du chêne | |
| 90.5 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst. | Polypore du bouleau | |
| 95 | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát | Coriole de diverses couleurs | |
| 95.4 | <i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk, ss Bres. | Schizopore paradoxal | |
| 97 | <i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst. | Leptopore brûlé | |
| 109 | <i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers. | Trompette des morts | |
| 111 | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr. | Girofle, chanterelle | |
| 116.5 | <i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter | Clavaire cendrée | |
| Sous-classe : Agaricomycetidae, Ordre : Tricholomatales | | | |
| 288 | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer | Clitocybe nébuleux | |
| 313 | <i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer | Armillaire couleur de miel | |
| 317 | <i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi | Armillaire bulbeuse | |
| 352 | <i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke | Laccaire améthyste | |
| 355 | <i>Laccaria cf laccata</i> | Laccaire laqué | |
| 369 | <i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon | Tricholome blanc | |
| 391 | <i>Tricholoma atrosquamosum</i> (Chevalier->) Saccardo | Tricholome squameux | |
| 453 | <i>Melanoleuca cf melaleuca</i> | | |
| 517 | <i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie beurrée | |
| 520 | <i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Collybie à pied en fuseau | |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie des chênes | |
| 579 | <i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray | Mycène à pied strié | |
| 587 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray | Mycène en casque | souches |
| 603 | <i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg | Mycène rose | |
| 631 | <i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v. Höhnel | Mucidule visqueuse | hêtre |
| Ordre : Agaricales | | | |
| 714 | <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer | Coulemelle, Lépiote élevée | |
| 769 | <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr. | Coprin micacé | |
| 772 | <i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers. | Coprin chevelu | |
| 776 | <i>Coprinus lagopus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Coprin pied de lièvre | |
| 804 | <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton | Psathyrelle hydrophile | |
| 818 | <i>Psathyrella multipedata</i> (Peck)Smith | Psathyrelle cespéteuse | |
| Ordre : Amanitales | | | |
| 842 | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray | Amanite rougissante, Golmotte | |
| 855 | <i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray | Amanite citrine | |
| 856 | <i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat. | Amanite citrine blanche | |
| Ordre : Pluteales | | | |
| 858 | <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer | Plutée couleur de cerf | |
| Ordre : Entolomatales | | | |
| 910 | <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer | | |
| Ordre : Cortinariales | | | |
| 987 | <i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet | Hébélome à centre foncé | |
| 993 | <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Hébélome échaudé | |
| 1002 | <i>Hebeloma anthracophilum</i> Maire | Hébélome des charbonnières | Terre brûlée |
| 1050 | <i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer | Inocybe à lames terreuses | |
| 1135 | <i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Cortinaire à pied courbe | |
| 1204 | <i>Cortinarius elatior</i> Fr. | Cortinaire élevé | hêtre |
| 1288 | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer | Hypholome en touffes | souches |
| 1308 | <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Bolbitie jaune d'oeuf | |
| Ordre : Russulales | | | |
| 1345 | <i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr. | Russule noirissante | |
| 1375 | <i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell | Russule du hêtre | hêtre |
| 1376 | <i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Russule fragile | |
| 1381 | <i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr | Russule pourpre et noir | |
| 1408 | <i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr. | Russule charbonnière | |
| 1413 | <i>Russula vesca</i> Fr. | Russule comestible | |
| 1424 | <i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer | Russule presque bleue | |
| 1432 | <i>Russula puellaris</i> Fr. | Russule jaunissante | |
| 1493 | <i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo | Russule caméléon | |
| 1500 | <i>Russula ochroleuca</i> Pers. | Russule ocre et blanc | |
| 1501 | <i>Russula claroflava</i> Grove | Russule jaune clair | bouleau |
| 1523 | <i>Lactarius pubescens</i> Fr. | Lactaire pubescent | |
| 1541 | <i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray | Lactaire plombé | |
| 1544 | <i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Lactaire muqueux | hêtre |
| 1581 | <i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Lactaire tranquille | chêne |
| 1581 | <i>Lactarius trivialis</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Lactaire trivial | bouleau |
| 1595 | <i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora | Lactaire des ornières | |
| Ordre : Boletales | | | |
| 1611 | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr. | Paxille enroulé | |
| 1653 | <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet | Bolet à chair jaune | |
| 1653.5 | <i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet | Bolet pruneux | |
| 1659 | <i>Xerocomus parasiticus</i> (Bulliard:Fr.)Quélet | Bolet parasite | <i>Scleroderma citrinum</i> |
| 1676 | <i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr. | Cépe d'été | |
| 1681 | <i>Boletus erythropus</i> Pers. | Bolet à pied rouge | |
| 1709 | <i>Leccinum cf scabrum</i> | Bolet rude | bouleau |
| 1713 | <i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades | Bolet rude gris brun | bouleau |
| Sous-classe : Gasteromycetidae | | | |
| 1726 | <i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers. | Scléroderme commun | |
| 1733 | <i>Morganella pyriformis</i> (= <i>Lycoperdon pyriforme</i>) | Vesse-de-loup en forme de poire | |
| 1735 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers. | Vesse-de-loup perlée | |
| 1745 | <i>Phallus impudicus</i> L.:Pers. | Satyre puant | |