

| Bois de Morval (95) , 16 mai 2009 | | 39 espèces de champignons | | | MEN : 2213A |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|---|---|
| N° CD | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
| sous-DIVISION ASCOMYCOTINA | | | | | |
| Lichens | | | | | |
| | <i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd. | | | | |
| | <i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. | | | | |
| Sous-classe Pyrenomycetideae | | | | | |
| 4,1 | <i>Hypoxylon multifforme</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Hypoxylon multifforme | | bouleau | |
| 4,1 | <i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr. | | | | |
| 7,5 | <i>Gnomonia cerastris</i> (Riess) Cesati & De Notaris | | | sur pétiote d'érable champêtre | |
| 7,8 | <i>Cucurbitaria laburni</i> (Pers.:Fr.)Cesati & De Notaris | | | sur branches mortes de <i>Laburnum</i> (Cytise) | |
| Sous-classe Pezizomycetideae | | | | | |
| 23 | <i>Helvella acetabulum</i> (L.:Fr.)Quélet | Helvelle en gobelet | | | |
| 29,5 | <i>Tarzetta spurcata</i> (Pers.) Harmaja | | | | 3,5 cm de diamètre. Spores biguttulées. Face hyméniale (intérieur) ombiliquée au centre. Paraphyses fines rarement coudées au sommet. Proche de <i>T. catina</i> . À confirmer. |
| sous-DIVISION BASIDIOMYCOTINA | | | | | |
| Classe : Phragmobasidiomycètes | | | | | |
| 47 | <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wetstein | Oreille de judas | | sureau | |
| 48,5 | <i>Phleogena faginea</i> (Fr.:Fr.)Link | | | Érable | |
| 52,5 | <i>Exidiopsis calcea</i> (Pers. : Fr.) Wells | | | | <i>Tremellaceae</i> |
| 54,5 | <i>Eichleriella deglubens</i> (Berkeley et Broome) Reid | | | sur branches mortes, sur terrain calcaire | |
| Classe : Homobasidiomycètes | | | | | |
| Sous-classe : Aphylophoromycetideae | | | | | |
| 60,5 | <i>Dendrothele acerina</i> (Pers. : Fr.) Lemke | | | sur tronc d'érable champêtre | gris cendré |
| 62 | <i>Merulioopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns | Mérule papyracée | <i>M. papyrinus</i> | | |
| 64,5 | <i>Hyphodontia sambuci</i> Velenovsky | | <i>Hyphodema s., Lyomyces s.</i> | | |
| 69,6 | <i>Peniophora lycii</i> (Pers.)v.Höhnel & Litschauer | Péniophore du Lyciet | | | |
| 69,6 | <i>Peniophora boidinii</i> Reid | | | sur branche morte de <i>Crataegus</i> | Espèce rare |
| 80,5 | <i>Phellinus ribis f. evonymi</i> (Kalchbrenner) | Polypore du fusain | | fusain | |
| 94 | <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacquin : Fr.) Karsten | Polypore cynabre | | | |
| 95 | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát | Tramète versicolore | | | |
| 95,5 | <i>Ceriporia mellita</i> (Bourdot) Bondartsev & Singer | | <i>Poria rhodella</i> | | Petits pores dans surface résupinée |
| 106 | <i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Polypore variable | | | |
| 107,5 | <i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr. | Polypore cilié | | | |
| 116 | <i>Clavulina cristata</i> (Holmskj.:Fr.)Schoet. | Clavaire à crêtes | | | Parasitées par <i>Spadicoides clavariarum</i> le faisant ressembler à <i>C. Cinerea</i> . |
| Sous-classe : Agaricomycetideae | | | | | |
| Ordre : Tricholomatales | | | | | |
| 141 | <i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten | Panelle styptique | | | |
| 197 | <i>Hygrocybe konradii</i> Haller | Hygrophore de Konrad | | pelouse | Spores subglobuleuses 10-11,5 x 8,5 µm. Q=1.3 |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie des chênes | | | |
| 608 | <i>Mycena acicula</i> (Schaeff.)Kumm. | Mycène orange | | | |
| Ordre : Agaricales | | | | | |
| 752 | <i>Agaricus porphyrrhizon</i> Orton | Agaric porphyre | | | Odeur d'amende amère |
| 758 | <i>Coprinus auricomus</i> Patouillard | Coprin à poils jaunes | | | |
| 766 | <i>Coprinus domesticus</i> (Bolt.:Fr.)Gray | Coprin domestique | | | |
| 769 | <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr. | Coprin micacé | | | |
| 813,5 | <i>Psathyrella cf. obtusata</i> (Pers. : Fr.) A.H.Smith | | | | |
| Ordre : Cortinoriales | | | | | |
| 1298 | <i>Agrocybe molesta</i> (Lasch) Singer | Agrocybe dur | | pelouse | |
| 1304 | <i>Agrocybe pediades</i> (Fr.:Fr.)Fayod | Agrocybe des pelouses | | pelouse | |
| 1306 | <i>Agrocybe vervecii</i> (Fr. : Fr.) Singer | Agrocybe jaune | | pelouse | |
| Ordre : Russulales | | | | | |
| 1350 | <i>Russula delicata</i> Fr. | Russule sans lait | | sous <i>Helianthemum nummularium</i> | Habitat calcicole. Ornementation sporale basse. |
| Sous-classe : Gasteromycetideae | | | | | |
| 1725 | <i>Tulostoma brumale</i> Pers. : Pers. | Tulostome des brumes | | pelouse | |
| 1739 | <i>Rhizopogon luteolus</i> Fr. : Fr. | Rhizopogon jaune | <i>R. obtextus</i> | sous pins | Semi hypogé, beige à rose |
| Orchidées | | | | | |
| | <i>Anacamptis pyramidalis</i> | Orchis pyramidal | | | |
| | <i>Dactylorhiza maculata</i> | Orchis tacheté | | | |
| | <i>Gymnadenia conopsea</i> | Orchis moucheron | | | |
| | <i>Limodorum abortivum</i> | Limodore à feuilles avortées | | | |
| | <i>Listera ovata</i> | Listère à feuilles ovales | | | |
| | <i>Neottia nidus-avis</i> | Néottie nid d'oiseau | | | |
| | <i>Ophrys fuciflora</i> | Ophrys bourdon | | | |
| | <i>Ophrys insectifera</i> | Ophrys mouche | | | |
| | <i>Orchis militaris</i> | Orchis militaire | | | |
| | <i>Orchis purpurea</i> | Orchis pourpre | | | |
| | <i>Platanthera chlorantha</i> | Orchis Verdâtre | | | |