

Forêt de Marly, Etoile aimable, 3 octobre 2009, 32 espèces			Commune : Fourqueux	MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i>					
2.5	<i>Sepedomium chrysospermus</i> (Bulliard : Fr.) Link	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i> (Bull)		Bolet	
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise		hêtre	
Sous-classe <i>Pezizomycetideae</i>					
9.3	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch : Fr.) Karsten	Pézize blanc virginal	<i>Dasyscyphus v.</i>		
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
82.5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré		châtaignier	
90.5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90.7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)Bc	Lenzite tricolore		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95.2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
105.2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster</i>		
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>					
Ordre : Tricholomatales					
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne		souche de hêtre	
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel		souche	
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		chêne	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			Cystides ornées d'excroissances digitées
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Cortinoriales					
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante			
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653.8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		châtaignier	
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1712	<i>Leccinum variicolor</i> Watling	Bolet ramoneur	<i>L. oxydabile</i>	bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun		bouleau	Spores allongées 19-22 µm
Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>					
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			