

| Bois de Verneuil-sur-Seine, 7 novembre 2009, 85 espèces | | | Commune : Verneuil-sur-Seine | | MEN : 2213C |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| N° CD | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
| | sous-DIVISION ASCOMYCOTINA | | | | |
| | Sous-classe Pyrenomycetidae | | | | |
| 4 | <i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx. | Hypoxylon en forme de fraise | | hêtre | |
| | sous-DIVISION BASIDIOMYCOTINA | | | | |
| | Classe : Phragmobasidiomycètes | | | | |
| 56 | <i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr. | Calocère cornée | | | |
| | Classe : Homobasidiomycètes | | | | |
| | Sous-classe : Aphyllorphomycetidae | | | | |
| 66 | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr. | Stérée hirsute | | | |
| 67.5 | <i>Stereum submentosum</i> Pouzar | Stérée submenteuse | | | Hyménium se tachant de jaune au toucher |
| 88.5 | <i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahl. : Fr.) M. Bon | Polypore balsamique | | pin | |
| 90.5 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst. | Polypore du bouleau | | bouleau | |
| 96 | <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden | | | pin | |
| 100 | <i>Oligoporus caesius</i> (Schrad.:Fr.)Gilberts.& Ryv. | Polypore bleuté des conifères | <i>Postia caesia</i> | pin | |
| 115 | <i>Antomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich | Clavaire en chandelier | | | |
| 121 | <i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet | Ramaire droite | | | |
| | Sous-classe : Agaricomycetidae | | | | |
| | Ordre : Tricholomatales | | | | |
| 141 | <i>Panelus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten | Panelle styptique | | | |
| 157 | <i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer | Pleurote terrestre | | Branche de noisetier | Chapeau pubescent. Lames jaunes à maturité, odeur et saveur de farine. Allure de grosse crépidote |
| 274 | <i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Clitocybe à pied clavé | | | |
| 277 | <i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Clitocybe en entonnoir | | | |
| 287.5 | <i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat. | Clitocybe inversé des feuillus | | | |
| 288 | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer | Clitocybe nébuleux | <i>Lepista n.</i> | | |
| 292 | <i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Clitocybe anisé | | | |
| 303 | <i>Clitocybe fragrans</i> (Withering:Fr.)Kummer | Clitocybe anisé strié | | | |
| 310 | <i>Clitocybe decembris</i> Singer | Clitocybe bicolor | <i>C. bicolor</i> | | |
| 313 | <i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer | Armillaire couleur de miel | | | |
| 327 | <i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Rath. | Omphale épingle | | Mousse | |
| 328 | <i>Rickenella swartzii</i> (Fr.:Fr.)Kuyper | Omphale de Swartz | | Mousse | |
| 352 | <i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke | Laccaire améthyste | | | |
| 368 | <i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer | Tricholome blanc | | | |
| 420 | <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer | Tricholome rutilant | | pin | |
| 424 | <i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke | Pied bleu | | | |
| 425 | <i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer | Lépiste sordide | | | |
| 431 | <i>Ripartites tricholoma</i> (Alb.& Schw.:Fr.)Karsten | Ripartite poilu | | | |
| 486.5 | <i>Tephrocycbe ambusta</i> (Fr. : Fr.) Donk | | | rond brûlé | forte odeur et saveur de farine |
| 486.5 | <i>Tephrocycbe atrata</i> (Fr.:Fr.)Donk | | <i>Lyophyllum atratum</i> | rond brûlé | Proche de <i>Myxomphalia maura</i> avec des lames libres |
| 488 | <i>Tephrocycbe mephitica</i> (Fr.) Moser | | | | Chapeau pruineux |
| 491 | <i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.:Fr.)Patouillard | Crinipelle | | | |
| 494 | <i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr. | Marasme en rosace | | pin | |
| 497 | <i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr. | Marasme petite roue | | | |
| 504 | <i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr. | Faux mousseron, Marasme des Oréades | | pelouse | |
| 517 | <i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie beurée | | | |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie des chênes | | chêne | |
| 525 | <i>Collybia kuehneriana</i> Singer | Collybie à pied rouge | <i>C. erythropus, marasmioides</i> | | |
| 535 | <i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer | Collybie queue de souris | | cône de pin | |
| 539 | <i>Hemimycena mairei</i> (Gilbert)Singer | Mycène de Maire | | pelouse | |
| 564 | <i>Mycena olivaceomarginata</i> (Masse) Massee | Mycène à arête olive | | pelouse | |
| 579 | <i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray | Mycène à pied strié | | | |
| 580.5 | <i>Mycena filipes</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Mycène à odeur d'iode | | | |
| 585 | <i>Mycena epipterygia</i> var. <i>epipterygioides</i> (Pearson) Kühner | | <i>M. epipterygioides</i> | | |
| 587 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray | Mycène en casque | | | |
| 588 | <i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet | Mycène inclinée | | | |
| 596 | <i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo | Mycène à lait blanc var. noire | <i>M. galopus</i> var. <i>nigra</i> | | |
| 600 | <i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet | Mycène à lames pourprées | | | |
| 601 | <i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène pure | | | |
| 601.3 | <i>Mycena pura</i> f. <i>ianthina</i> (Secretan ex Gillet) Maas Geesteranus | | | | |
| 603 | <i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg | Mycène rose | | | |
| 613 | <i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet | Mycène à pied gluant | <i>Roridomyces roridus</i> | | |
| 625 | <i>Megacollybia platyphyla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar | Collybie à larges lames | | | |
| | Ordre : Agaricales | | | | |
| 673.5 | <i>Lepiota ochraceosulfurens</i> Locquin ex Bon | Lépiote ocre jaune soufre | | | |
| 713 | <i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer | Lépiote déguenillée | <i>Chlorophyllum rhacodes</i> | | |
| 747 | <i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck | Agaric anisé des bois | | | |
| 780 | <i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray | Coprin pie | <i>Coprinopsis picacea</i> | | |
| 804 | <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton | Psathyrelle hydrophile | | | |
| | Ordre : Amanitales | | | | |
| 837 | <i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers. | Amanite tue-mouches | | bouleau | |
| 839 | <i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz | Amanite panthère | | | |
| 842 | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray | Amanite rougissante, Golmotte | | | |
| 855 | <i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray | Amanite citrine | | | |
| | Ordre : Pluteales | | | | |
| 858 | <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer | Pluté couleur de cerf | | | |
| | Ordre : Entolomatales | | | | |
| 920 | <i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.)Moser | Entolome à pied hérissé | | | Odeur de sardine fraîche |
| | Ordre : Cortinariales | | | | |
| 993 | <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Hébélome échaudé | | | |
| 1109 | <i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Cortinaire anormal | | | |
| 1209 | <i>Gymnopilus penetrans</i> var. <i>hybridus</i> (Bull.) Roux | Gymnopile hybride | <i>G. hybridus</i> | pin | |
| 1228 | <i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner | Galère marginée | | bois de bouleau | |
| 1243 | <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Crépidote variable | | | Lames rosées, petites spores cylindracées |
| 1259 | <i>Pholiota lubrica</i> (Pers. : Fr.) Singer | Flammule lubrique | | | Chapeau visqueux, lames adnées |
| 1267 | <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet | Strophaire vert-de-gris | | | |
| 1268 | <i>Stropharia caerulea</i> Kreisel | Strophaire bleu | <i>cyanea</i> | | |
| 1288 | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer | Hypholome en touffes | | | |
| | Ordre : Russulales | | | | |
| 1351 | <i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola | Russule verdâtre | | | |
| 1381 | <i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer | Russule pourpre et noir | <i>R. krombholzii</i> | | |
| 1581 | <i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Lactaire à odeur de punaise | | | |
| 1597 | <i>Lactarius hepaticus</i> Plowright | Lactaire hépatique | | pin | |
| | Ordre : Boletales | | | | |
| 1609 | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire | Fausse girofle | | pin | |
| 1611 | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr. | Paxille enroulé | | | |
| 1640 | <i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel | Nonette voilée | | pin | |
| 1657 | <i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert | Bolet bai | | | |
| 1669 | <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr. | Cèpe de Bordeaux | | | |
| 1709 | <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray | Bolet rude | | bouleau | |
| | Sous-classe : Gasteromycetidae | | | | |
| 1733 | <i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger | Vesse-de-loup en forme de poire | <i>Lycoperdon pyriforme</i> | | |
| 1735 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers. | Vesse-de-loup perlée | | | |