

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, La butte aux loups, 8 novembre 2009, 138 espèces					Commune : Dourdan (91) MEN : 2216A
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA				
	Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i>				
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
	Sous-classe <i>Peizomycetideae</i>				
9,2	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pézize ferme		chêne	
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
	SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA				
	Classe : <i>Phragmobasidiomycètes</i>				
53	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scopoli : Fr.) Karsten	Faux hydne gélatineux		pin	
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
58,5	<i>Ditella pezizaeformis</i> (Léveillé) Reid		<i>Femsjonia pezizaeformis</i>		
	Classe : <i>Homobasidiomycètes</i>				
	Sous-classe : <i>Aphyllorphoromycetideae</i>				
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
64,5	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray				Petits aiguillons ocre
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
74	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Hydne cure-oreilles		cône de pin	
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>tuberaster</i>		
112	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.	Chanterelle en tube			
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier			
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
	Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>				
	Ordre : <i>Tricholomatales</i>				
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne			
239	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Hygrophore des bois			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de <i>Cossus</i>			Odeur de topinambour
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			+ <i>Clitocybe cerrusata</i> et <i>vibicina</i> non confirmés
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe bicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
356	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>proxima</i> (Boudier) Maire	Laccaire de Moëller	<i>laccata</i> var. <i>moelleri</i>		Haut de 11cm, chapeau squamuleux 5cm. Spores 10x8 µm, basides tétrasporiques.
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
390	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer	Tricholome rutilant		pin	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
494	<i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Marasme en rosace		aiguilles de pin	
499	<i>Marasmius scorodonius</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1836	Marasme aliacé			
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades		pelouse	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurée			
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes		chêne	
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guétrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris		cône de pin	
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		souche	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		souche	
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
601,3	<i>Mycena pura</i> fo. <i>alba</i> (Gill.)Kühn.	Mycène pure forme blanche			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
613	<i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Mycène à pied gluant	<i>Roridomyces roridus</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
630	<i>Oudemansiella radicata</i> var. <i>marginata</i>	Mucidule radicante			Arête des lames brun noir
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
	Ordre : <i>Agaricales</i>				
666	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiote à demie nue	<i>C. seminuda</i>		
668	<i>Lepiota ignivolva</i> Bousset & Josserand ex Josserand	Lépiote à base rouge			
672	<i>Lepiota ventriospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées			
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
709,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
803,5	<i>Psathyrella hydrophiloidea</i> Kits v.Waveren		<i>Psathyrella appendiculata</i> ss Kühner &		Lames brun rougeâtre
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombolz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
	Ordre : Entolomatales				
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			Odeur de farine
	Ordre : Cortinariales				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radicant			
1055,5	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner	Inocybe pelucheux			
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1135,5	<i>Cortinarius agathosmus</i> Brandrud, Lindström & Melot				ou <i>subviolascens</i> . Proche de <i>torvus</i>
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon			Odeur de miel, lames ocre
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant			Chair blanche
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		bois de pin et	parfois de chêne
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			Lames brun rosé, spores cylindracées 5,5-6x3,7 µm
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		souche	
	Ordre : Russulales				
1350	<i>Russula delica</i> Fr.	Russule sans lait			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardeine	<i>R. sardonica</i>	pin	
1403	<i>Russula vetermosa</i> Fr.	Russule languissante		feuillus	Saveur acre, chapeau rose à disque jaune olivacé. Lames ocre. FeSO4 gris rose
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible, Russule vieux-rose		chêne	Lames blanches. Chapeau rose jambon
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1569	<i>Lactarius rufus</i> (Scopoli : Fr.) Fr.	Lactaire roux		pin	sur terrain acide
1576	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon	Lactaire fauve orangé			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			Odeur de <i>Pelargonium</i>
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		pin	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonette voilée		pin	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1649	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet tacheté		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1653,5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetidae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			