

| Forêt de Bois-d'Arcy, 9 octobre 2010 | | 100 espèces | Commune : Bois-d'Arcy | MEN : 2214D | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| N° CD | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
| | MYXOMYCETES | | | | |
| 0,1 | <i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers | Suie putréfiée | | | |
| | SOUS-DIVISION ZYGOMYCOTINA | | | | |
| 0,2 | <i>Spinellus fusifer</i> (Link) Tiegh. | Spinelle en fuseau | | <i>Collybia dryophila</i> | |
| | SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA | | | | |
| | Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i> | | | | |
| 4,5 | <i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bulliard : Fr.) Kuntze | | <i>Hypoxyylon nummularia</i> | hêtre | sur bois mort |
| | Sous-classe <i>Pezizomycetideae</i> | | | | |
| 10 | <i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al. | Chorosplénium bleu-vert | | | |
| 19 | <i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr. | Helvelle crépue | | | |
| | SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA | | | | |
| | Classe : Phragmobasidiomycètes | | | | |
| 49,1 | <i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr. | Trémelle orangée | | Sur <i>Stereum</i> | |
| | Classe : Homobasidiomycètes | | | | |
| | Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i> | | | | |
| 66 | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr. | Stérée hirsute | | | |
| 87 | <i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr. | Dédalée du chêne | | chêne | |
| 90,5 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst. | Polypore du bouleau | | bouleau | |
| | Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i> | | | | |
| | Ordre : Tricholomatales | | | | |
| 276 | <i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet | Tête de moine | | | |
| 277 | <i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Clitocybe en entonnoir | | | |
| 287,5 | <i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat. | Clitocybe inversé des feuillus | | | |
| 288 | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer | Clitocybe nébuleux | <i>Lepista n.</i> | | |
| 292 | <i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Clitocybe anisé | | | |
| 293 | <i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Clitocybe des feuilles | | | |
| 310 | <i>Clitocybe decembris</i> Singer | Clitocybe dicolore | <i>C. bicolor</i> | | |
| 313 | <i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer | Armillaire couleur de miel | | | |
| 327 | <i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith. | Omphale épingle | | | |
| 352 | <i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke | Laccaire améthyste | | | |
| 355,3 | <i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon | Laccaire proche de laqué | | | |
| 368 | <i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer | Tricholome blanc | | | |
| 369 | <i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon | Tricholome blanc | | | |
| 381 | <i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Tricholome soufré | | | |
| 505 | <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer | Marasme des ramilles | | | |
| 517 | <i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie beurrée | | | |
| 520 | <i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Collybie à pied en fuseau, souchette | | chêne | |
| 521 | <i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer | Collybie maculée | | | |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie des chênes | | chêne | |
| 525 | <i>Collybia kuehneriana</i> Singer | Collybie à pied rouge | <i>C. erythropus, marasmioides</i> | | |
| 548 | <i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène à disque basal | | | |
| 579 | <i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray | Mycène à pied strié | | | |
| 580 | <i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet | Mycène à pied raide | | | |
| 580,5 | <i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Mycène à odeur d'iode | | | |
| 587 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray | Mycène en casque | | | |
| 588 | <i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet | Mycène inclinée | | | |
| 595 | <i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène à lait blanc | | | |
| 600 | <i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet | Mycène à lames pourprés | | | |
| 601 | <i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène pure | | | |
| 603 | <i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg | Mycène rose | | | |
| | Ordre : Agaricales | | | | |
| 673 | <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer | Lépiote en bouclier | | | |
| 674 | <i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer | Lépiote crêtée | | | |
| 709,5 | <i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser | Lépiote étoilée | | | |
| 713 | <i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer | Lépiote déguenillée | <i>Chlorophyllum rhacodes</i> | | |
| 714,5 | <i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni | Coulemelle | <i>M. fuliginosa</i> | | |
| 740 | <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz. | Agaric sanguinolent | | | |
| 747 | <i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck | Agaric anisé des bois | | | |
| 751 | <i>Agaricus semotus</i> Fr. | Psalliotte solitaire | | | Odeur anisée |
| 759 | <i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr. | Coprin plissé | <i>Parasola p.</i> | | |
| 772 | <i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers. | Coprin chevelu | | | |
| 774 | <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr. | Coprin noir d'encre | | | |
| 776 | <i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Coprin pied de lièvre | <i>Coprinopsis l.</i> | | |
| 782 | <i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser | Lacrymaire velouté | | | |
| 803 | <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire | Psathyrelle de De Candolle | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 804 | <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton | Psathyrelle hydrophile | | |
| | Ordre : Amanitales | | | |
| 828 | <i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr. | Amanite fauve | | |
| 842 | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray | Amanite rougissante, Golmotte | | |
| 855 | <i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray | Amanite citrine | | |
| 855,5 | <i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat. | Amanite citrine blanche | | |
| | Ordre : Pluteales | | | |
| 858 | <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer | Plutée couleur de cerf | | |
| 866 | <i>Pluteus hispidulus</i> (Fr. : Fr.) Gillet | | | |
| 871 | <i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer | Plutée couleur de lion | <i>P. fayodii</i> | |
| 888 | <i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer | Plutée veiné | | |
| | Ordre : Entolomatales | | | |
| 910 | <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer | Entolome gris rosâtre | | |
| 968 | <i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer | Meunier, Clitopile petite prune | | |
| 972 | <i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuyper & Noordeloos | Rhodocybe tronqué | | |
| | Ordre : Cortinariales | | | |
| 993 | <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Hébélome échaudé | | |
| 1092 | <i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten | Pholiote ridée | | |
| 1105 | <i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Cortinaire blanc-violet | | |
| 1120 | <i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> Orton | Cortinaire jaune cannelle | | |
| 1135 | <i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Cortinaire à pied courbe | | |
| 1139 | <i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr. | Cortinaire pailleté | | Odeur de <i>Pelargonium</i> |
| 1163 | <i>Cortinarius nemorensis</i> (Fr.) Lange | Cortinaire terreux des feuillus | | Odeur terreuse, KOH jaune |
| 1166 | <i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Cortinaire à marge brisée | | |
| 1173 | <i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr. | Cortinaire purpuréscent | | |
| 1235 | <i> Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet | Tubaire furfuracée | | |
| 1243 | <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Crépidote variable | | Spores 6x3,5 µm |
| 1267 | <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quél. | Strophaire vert-de-gris | | |
| 1288 | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer | Hypholome en touffes | | |
| 1308 | <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Bolbitie jaune d'oeuf | pelouse | |
| 1310 | <i>Bolbitius aleuriatus</i> (Fr.)Singer | Bolbitie gris porphyre | | |
| 1334 | <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.:Fr.)Quél. | Panéole marbré | pelouse | |
| | Ordre : Russulales | | | |
| 1364 | <i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Russule de fiel | hêtre | |
| 1381 | <i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr | Russule pourpre et noir | <i>R. krombholzii</i> | |
| 1413 | <i>Russula vesca</i> Fr. | Russule comestible | | |
| 1424 | <i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer | Russule presque bleue | | |
| 1469 | <i>Russula graveolens</i> Romell | Russule malodorante | chêne | Odeur de crustacés, FeSO4 vert foncé |
| 1500 | <i>Russula ochroleuca</i> Pers. | Russule ocre et blanc | | |
| 1579 | <i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr. | Lactaire à lait jaunissant | chêne | |
| 1581 | <i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Lactaire à odeur de punaise | chêne | |
| | Ordre : Boletales | | | |
| 1609 | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire | Fausse girolle | pin | |
| 1632 | <i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille | Bolet poivré | | |
| 1653 | <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet | Bolet à chair jaune | | |
| 1657 | <i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert | Bolet bai | | |
| 1669 | <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr. | Cèpe de Bordeaux | | |
| 1681 | <i>Boletus erythropus</i> Pers. | Bolet à pied rouge | | |
| | Sous-classe : Gasteromycetideae | | | |
| 1726 | <i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers. | Scléroderme commun | | |
| 1730 | <i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck | Calvitie en coupe | | |
| 1735 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers. | Vesse-de-loup perlée | | |
| 1736 | <i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers. | Vesse-de-loup molle | | |
| 1745 | <i>Phallus impudicus</i> L.:Pers. | Satyre puant | | |