

Forêt de Ste Apolline, 25 septembre 2011, 68 espèces		Commune : Paisir	MEN : 2214C		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante			
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae					
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme épaissi			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaria améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaria proche de laqué			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
547	<i>Mycena rhenana</i> Maas Geesteranus & Winterhoff	Mycène rhénane		aulne	Sur strobile d'aulne glutineux
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollihya platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
Ordre : Agaricales					
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
675,5	<i>Lepiota ignipes</i> Locquin ex Bon				Spores éperonnées 12 x 4 µm
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841,5	<i>Amanita excelsa</i> (Fr. : Fr.) Bertillon	Amanite élevée			variété de l'Amanite épaisse
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre			
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			Odeur de farine
Ordre : Cortinariales					
983	<i>Alnicola scolecina</i> (Fr.) Romagnesi	Alnicole sombre		aulne	
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1121	<i>Cortinarius uliginosus</i> Berkeley	Cortinaire des marais		saule	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			Lames un peu âcres

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betula</i>	bouleau	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1566	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide		bouleau	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			Odeur de <i>Pelargonium</i>
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire à odeur de chicorée			
1589	<i>Lactarius serifulus</i> (DC. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait séreux	<i>L. cimirius</i>		
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			