

Forêt de Rambouillet, 1 ^{er} octobre 2011, 68 espèces		Commune : La Celle-les-Bordes		MEN : 2215C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
30	<i>Otidea onotica</i> (Pers. : Fr.) Fuckel	Oreille de lièvre			Spores 11-13 x 5,5-6 µm
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66,6	<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schweiniz) Ellis		<i>S. rameale</i>		
79,5	<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sow. : Fr.) Lév. 1846				
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante			
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
95,3	<i>Trametes multicolor</i> (Schaeffer)Jülich	Tramète zonée	<i>T. ochracea</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne		Tilleul	spores cylindriques allongées
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau			
580,5	<i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicante</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
Ordre : Agaricales					
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		Spores en "mitre"
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
857	<i>Amanita porphyria</i> Albertini & Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre			
Ordre : Cortinariales					
982	<i>Alnicola melinoides</i> (Bulliard : Fr.) Kühner	Alnicole jaunâtre	<i>escharoides</i>	aulne	cheilocystides ventruées à long bec
983	<i>Alnicola scolecina</i> (Fr.) Romagnesi	Alnicole sombre		aulne	
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1018,5	<i>Inocybe obsoleta</i> Romagn. 1958	Inocybe fastigié var. blanche			leiosporé acystidié
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1055,5	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner	Inocybe pelucheux			
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet			
1112	<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Cortinaire à armille écailleuse		bouleau	
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1136,5	<i>Cortinarius alnetorum</i> (Vel.) Mos. 1967	Cortinaire à pied brun noir		aulne	Noir
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1356	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer	Russule à odeur d'amandes amères			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1415	<i>Russula virescens</i> (Sch.)Fr.	Palomet, Russule verdoyante			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	Odeur de crustacés
1476	<i>Russula velenovskýi</i> Melzer & Zvára	Russule rouge cuivre			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
	Ordre : Boletales				
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1709,5	<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i> (Smotlacha) Dermek			bouleau	
1712	<i>Leccinum variicolor</i> Watling	Bolet ramoneur	<i>L. oxydabile</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1727,5	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.				boucles aux cloisons
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			