

Forêt de Meudon, 5 novembre 2011, 70 espèces		Communes : Chaville (92)		MEN : 2314C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre			
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique			
Classe : Pezizomycetes					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
12	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettsteim	Oreille de judas		sureau	
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : <i>Aphyllphoromycetideae</i>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum gausapatum</i> (Fr. : Fr.) Fr.				
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95,5	<i>Funalia gallica</i> (Fr.:Fr.)Bondartsev & Singer	Tramète des Gaules	<i>Corioloopsis gallica</i>		
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>					
Ordre : Tricholomatales					
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
573,5	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill)Murrill	Mycène printanière			
580,5	<i>Mycena filipes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
632	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.:Fr.)Karsten	Collybie à pied velouté			
Ordre : Agaricales					
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
731	<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	Agaric radicaant			
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté			
787	<i>Psathyrella prona</i> (Fr.) Gillet	Psathyrelle penchée			
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
806,5	<i>Psathyrella obtusata</i> var. <i>aberrans</i> Kits v.Waveren	Psathyrelle à chapeau obtus			
818	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck)A.H.Smith	Psathyrelle cespiteuse			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radicaant			Odeur de colle blanche
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon			
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1264	<i>Hemipholiota populnea</i> (Pers. : Fr.) Bon 1986	Pholiote destructrice	<i>destruens</i>	peuplier	
1287	<i>Hypholoma sublateralitium</i> (Fr.) Quélet	Hypholome couleur de briques			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Kromholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. kromholzii</i>		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			Odeur de <i>Pelargonium</i>
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1653,5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux	<i>Boletellus pruinatus</i>		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1711	<i>Leccinum pulchrum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude panaché			
1716	<i>Leccinum molle</i> (Bon) Bon	Bolet mou		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			