

| Forêt de Rambouillet, maison forestière du Mesle, 5 novembre 2011, 97 espèces | | | Commune : Condé-sur-Vesgre | MEN : 2314C | |
|---|--|--|---|-------------|-----------|
| N° CD | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
| SOUS-DIVISION ZYGOMYCOTINA | | | | | |
| 0,2 | <i>Spinellus fusifer</i> (Link) Tiegh. | Spinelle en fuseau | | Mycènes | |
| DIVISION ASCOMYCOTA | | | | | |
| Classe : Sordariomycetes | | | | | |
| 2 | <i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i> (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora 2007 | | <i>Cordyceps o.</i> | | |
| Classe : Pezizomycetes | | | | | |
| DIVISION BASIDIOMYCOTA | | | | | |
| Classe : Phragmobasidiomycètes | | | | | |
| 49 | <i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr. | Trémelle mésentérique | | | |
| 57 | <i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Calocère visqueuse | | pin | |
| Classe : Homobasidiomycètes | | | | | |
| Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i> | | | | | |
| 65 | <i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid | Plicature du hêtre | | | |
| 70 | <i>Thelephora terrestris</i> (Ehrhart : Fr.) Fr. | Téléphore terrestre | | | |
| 74 | <i>Auriscalpium vulgare</i> Gray | Hydne cure-oreilles | | cône de pin | |
| 90,5 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst. | Polypore du bouleau | | bouleau | |
| 96 | <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden | | | | |
| 97 | <i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst. | Tramète brûlée | | | |
| 100 | <i>Postia caesia</i> (Schrader : Fr.) Karsten | Polypore bleuté des conifères | <i>Oligoporus caesius</i> (S | pin | |
| 100,5 | <i>Postia ptychogaster</i> (Ludwig) Vesterholt | | <i>Oligoporus ptychogaster</i> | | |
| 111 | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr. | Girolle, chanterelle | | | |
| 112 | <i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet | Chanterelle en tube | <i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr. | | |
| 115,5 | <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr. | Clavaire crépue | | pin | |
| Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i> | | | | | |
| Ordre : Tricholomatales | | | | | |
| 174 | <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wülf.:Fr.)Kovalenko | Hygrophore blanc | <i>C. niveus, Hygrocybe v.</i> | | |
| 256 | <i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr. | Hygrophore blanc d'ivoire | | | |
| 288 | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer | Clitocybe nébuleux | <i>Lepista n.</i> | | |
| 306 | <i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quélet | Clitocybe moisi | | | |
| 352 | <i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke | Laccaire améthyste | | | |
| 353 | <i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton | Laccaire bicolore | | | |
| 355 | <i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke | Laccaire laqué | | | |
| 355,3 | <i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon | Laccaire proche de laqué | | | |
| 393 | <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeffer:Fr.)Kummer | Petit gris | | pin | |
| 403 | <i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quélet | Tricholome acerbe | | | |
| 406 | <i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo | Tricholome jaune et brun | | bouleau | |
| 424 | <i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke | Pied bleu | | | |
| 473 | <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer | Tricholome agrégé | | | |
| 485 | <i>Tephrocybe rancida</i> (Fr.:Fr.)Donk | Tephocybe rance | | | |
| 494 | <i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr. | Marasme en rosace | <i>Setulipes a.</i> | pin | |
| 497 | <i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr. | Marasme petite roue | | | |
| 510 | <i>Micromphale brassicolens</i> (Romagnesi)Orton | Marasme à odeur de chou | <i>Collybia b., Gymnopus b.</i> | | |
| 514 | <i>Collybia tuberosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer 1871 | Collybie à sclérote noir | | | |
| 515 | <i>Collybia cookei</i> (Bres.) J. D. Arnold | Collybie à sclérote jaune | | | |
| 517 | <i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie beurrée | <i>Rhodocollybia butyracea</i> | | |
| 521 | <i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer | Collybie maculée | <i>Rhodocollybia maculata</i> | | |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie des chênes | <i>Gymnopus d.</i> | | |
| 535 | <i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer | Collybie queue de souris | <i>Collybia conigena</i> | cône de pin | |
| 580 | <i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet | Mycène à pied raide | | | |
| 580,5 | <i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Mycène à odeur d'iode | | | |
| 584 | <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray | Mycène des fougères | | | |
| 587 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray | Mycène en casque | | | |
| 593 | <i>Mycena vulgaris</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène vulgaire | | | |
| 595 | <i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène à lait blanc | | | |
| 596 | <i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo | Mycène à lait blanc var. noire | <i>M. galopus var. nigra</i> | | |
| 598 | <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb.&Schw.:Fr.)Kummer | Mycène sanguinolente, Mycène à lait rose | | | |
| 603 | <i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg | Mycène rose | | | |
| Ordre : Agaricales | | | | | |
| 714,5 | <i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni | Coulemelle | <i>M. fuliginosa</i> | | |
| 804 | <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton | Psathyrelle hydrophile | | | |

| N° CD | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | Ordre : Amanitales | | | | |
| 837 | <i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers. | Amanite tue-mouches | | bouleau | |
| 837 | <i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Poumarat | Amanite tue-mouches | | | |
| 842 | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray | Amanite rougissante, Golmotte | | | |
| 855 | <i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray | Amanite citrine | | | |
| 855,5 | <i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat. | Amanite citrine blanche | | | |
| | Ordre : Pluteales | | | | |
| 858 | <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer | Plutée couleur de cerf | | | |
| | Ordre : Entolomatales | | | | |
| 910 | <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer | Entolome gris rosâtre | | | |
| 941 | <i>Entoloma serrulatum</i> (Pers. : Fr.) Hesler 1967 | Entolome à arête serrulée | | | |
| | Ordre : Cortinariales | | | | |
| 987 | <i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet | Hébélome à centre foncé | | | |
| 993 | <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Hébélome échaudé | | | |
| 1074 | <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | Inocybe laineux | <i>I. ovatocystis</i> | | |
| 1114 | <i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet | Cortinaire semi-sanguin | | | |
| 1166 | <i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Cortinaire à marge brisée | | | |
| 1208 | <i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill | Flammule pénétrante | | | |
| 1212 | <i>Gymnopilus picreus</i> (Pers. : Fr.) Karsten 1879 | Gymnopile amer | <i>G. satur</i> | pin | |
| 1219 | <i>Galerina graminea</i> (Velenovský) Kühner | Galère des graminées | <i>G. laevis</i> | | |
| 1288 | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer | Hypholome en touffes | | | |
| | Ordre : Russulales | | | | |
| 1345 | <i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr. | Russule noirçissante | | | |
| 1376 | <i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr. | Russule fragile | | | |
| 1392 | <i>Russula sanguinaria</i> (Schumacher)Rauschert | Russule sanguine | <i>R. rosacea, R. sanguinaria</i> | pin | |
| 1393 | <i>Russula drimeia</i> Cooke | Russule sardeine | <i>R. sardonica</i> | pin | |
| 1418 | <i>Russula violeipes</i> Quélet 1898 | Russule à pied violet | | | |
| 1467 | <i>Russula cf. faginea</i> Romagn. | Russule des hêtraies | | hêtre | à confirmer |
| 1500 | <i>Russula ochroleuca</i> Pers. | Russule ocre et blanc | | | |
| 1503 | <i>Russula amara</i> Kucera | Russule amère | <i>R. caerulea</i> | pin | |
| 1522 | <i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers. | Lactaire à toison | | bouleau | |
| 1541 | <i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray | Lactaire plombé | <i>necator, turpis</i> | bouleau | |
| 1579 | <i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr. | Lactaire à lait jaunissant | | | |
| 1595 | <i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora | Lactaire des ornières | | | |
| | Ordre : Boletales | | | | |
| 1609 | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire | Fausse girofle | | pin | |
| 1609,5 | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> v. <i>pallida</i> Peck. | | <i>fuscusquamulosa</i> ? | pin | |
| 1611 | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr. | Paxille enroulé | | | |
| 1617 | <i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr. | Gomphide rose | | pin | |
| 1632 | <i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille | Bolet poivré | | | |
| 1635 | <i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Imazeki 1952 | Bolet élégant | | Mélèze | |
| 1640 | <i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel | Nonette voilée | | pin | |
| 1648 | <i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel | Bolet des bouviers | | pin | |
| 1649 | <i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze | Bolet tacheté | | pin | |
| 1653 | <i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet | Bolet à chair jaune | | | |
| 1657 | <i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert | Bolet bai | | | |
| 1669 | <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr. | Cèpe de Bordeaux | | | |
| 1702 | <i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát | Bolet orangé des chênes | | | |
| 1709 | <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray | Bolet rude | | bouleau | |
| | Sous-classe : Gasteromycetideae | | | | |
| 1726 | <i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers. | Scléroderme commun | | | |
| 1730 | <i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck | Calvitie en coupe | | | |
| 1735 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers. | Vesse-de-loup perlée | | | |
| 1735,5 | <i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers. | | | | |
| 1745 | <i>Phallus impudicus</i> L.:Pers. | Satyre puant | | | |