

Forêt de Saint-Germain, Avenue des Loges, 4 décembre 2011, 121 espèces		Commune : Saint-Germain-en-Laye	MEN : 2214B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre			
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise		hêtre	
6,5	<i>Xylaria filiformis</i> (Albertini et Schweiniz : Fr.) Fr.				
6,5	<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Xylaïre à long pied			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
Classe : Pezizomycetes					
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Groves & Wils.	Coryne charnue			
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crêpe			
21	<i>Helvella elastica</i> Bulliard:Fr.	Helvelle élastique			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
48,5	<i>Phleogena faginea</i> (Fr.:Fr.)Link	<i>faginea</i> (Lat.) : hêtre			
52	<i>Myxarium nucleatum</i> Wallroth	Exidie à noyau			
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllphoromycetideae					
61,6	<i>Phlebia radiata</i> Fr.	Plèbie orangée	<i>merismoides, aurantiaca</i>		
61,9	<i>Phlebiella vaga</i> (Fr. : Fr.) Karsten		<i>Xenasmatella vaga, Trechispora v.</i>		
61,9	<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees : Fr.) Maire	Vuilleminie dévoreuse			
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,6	<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schweiniz) Ellis		<i>S. rameale</i>		
69,5	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.:Fr.)Cooke	Péniophore du chêne			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schradler:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p., Poria mucida</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
95,1	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen:Fr.)Lloyd	Tramète hirsute			
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
117,2	<i>Clavulinopsis helvola</i> (Pers. : Fr.) Corner	Clavaire jaunâtre		pelouse	Spores echinulées
117,4	<i>Ramariopsis corniculata</i> (Pers.:Fr.)Corner	Clavaire cornue	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	pelouse	Odeur de farine
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
157	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer	Pleurote terrestre			
171	<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers. : Fr.) Bon	Hygrophore des prés		pelouse	
174	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulf.:Fr.)Kovalenko	Hygrophore blanc	<i>C. niveus</i>	pelouse	
177	<i>Cuphophyllus fuscescens</i> (Bresadola) Bon	Hygrophore brunâtre		pelouse	
183	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.:Fr.)Wünsche	Hygrophore jaune citrin		pelouse	
208	<i>Hygrocybe coccinea</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Hygrophore écarlate		pelouse	
214	<i>Hygrocybe reae</i> (Maire) Lange	Hygrophore de Rea		pelouse	
228	<i>Hygrocybe psittacina</i> (Schaeffer:Fr.)Kummer	Hygrocybe perroquet		pelouse	
260	<i>Hygrophorus carpini</i> Gröger	Hygrophore des charmes		charme	
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
393	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeffer:Fr.)Kummer	Petit gris		pin	
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé			
485	<i>Tephroclype rancida</i> (Fr.:Fr.)Donk	Tephroclype rance	<i>Lyophyllum r.</i>		
488	<i>Tephroclype mephitica</i> (Fr.) Moser		<i>Lyophyllum m.</i>		Chapeau gris clair pruneux. Spores 5,5 x 3,5 µm
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris		cône de pin	
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
606	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet	Mycène jaune pâle			
612	<i>Mycena speirea</i> (Fr.:Fr.)Gillet	Mycène en petits groupes			
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p.</i>		
630	<i>Oudemansiella radicata</i> var. <i>marginata</i>	Mucidule radicante			
641,5	<i>Dermoloma pseudocuneiformium</i> Herink ex Bob			pelouse	Spores 7 x 4,5-5 µm, pied gris ocracé
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.)Maire	Rhodotus palmé			
	Ordre : Agaricales				
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
675	<i>Lepiota castanea</i> Quélet	Lépiote châtain			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
731	<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	Agaric radicaant			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
746	<i>Agaricus arvensis</i> Sch.:Fr.	Agaric des jachères, Boule-de-neige			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Génevier	Psallote jaunissante			
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu		pelouse	
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
	Ordre : Amanitales				
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
868	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée brun d'ombre			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre			
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radicaant			
1044	<i>Inocybe lacera</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à pied brunissant			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1109	<i>Cortinarius azureovelatus</i> Orton	Cortinaire azuré-voilé			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1242,2	<i>Crepidotus epibryus</i> (Fr. : Fr.) Quélet				
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1287	<i>Hypholoma sublateralium</i> (Fr.)Quélet	Hypholome couleur de briques			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule verdâtre			
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	
1577	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire très fauve			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			Odeur de Pelargonium
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1654	<i>Xerocomus rubellus</i> Quélet	Bolet rougeâtre	<i>versicolor</i>		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		