

| Les Tailles des Herbelay, 30 septembre 2012, 66 espèces | | | Commune : Aigremont | MEN : 2214B | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| N° cd | Espèce | Nom français | Synonyme | Habitat | Remarques |
| MYXOMYCETES | | | | | |
| 0,1 | <i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers | Suie putréfiée | | | |
| DIVISION ASCOMYCOTA | | | | | |
| Classe : Pezizomycètes | | | | | |
| 9,2 | <i>Lanzia echinophila</i> (Bulliard:Fr.)Korf | Phallée des bogues | <i>Rutstroemia e.</i> | bogue de châtaigne | |
| 10 | <i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al. | Chorosplénium bleu-vert | | | |
| 22 | <i>Helvella macropus</i> (Pers.:Fr.)Karsten | Helvelle à long pied | | | |
| DIVISION BASIDIOMYCOTA | | | | | |
| Classe : Homobasidiomycètes | | | | | |
| Sous-classe : Aphyllophoromycetideae | | | | | |
| 65 | <i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid | Plicature du hêtre | | | |
| 81 | <i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten | Ganoderme luisant | | | |
| 82 | <i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With. | Langue de bœuf | | chêne | |
| 82,5 | <i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr. | Polypore soufré | | châtaignier | |
| 87 | <i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr. | Dédalée du chêne | | | |
| 90 | <i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx | Polypore marginé | <i>Ungulina marginata</i> | bouleau | |
| 90,5 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst. | Polypore du bouleau | | bouleau | |
| 90,6 | <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter | Tramète rougissante | | | |
| 90,7 | <i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) | Tramète rougissante | | | |
| 95 | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát | Tramète versicolore | | | |
| 95,3 | <i>Trametes multicolor</i> (Schaeffer)Jülich | Tramète zonée | <i>T. ochracea</i> | | |
| 95,4 | <i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray | | | | |
| 106,5 | <i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr. | Polypore élégant | | | |
| 111,2 | <i>Cantharellus pallens</i> Pilát 1951 | Girrolle pruineuse | <i>C. subpruinus</i> | | |
| 115 | <i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich | Clavaire en chandelier | | | |
| Sous-classe : Agaricomycetideae | | | | | |
| Ordre : Tricholomatales | | | | | |
| 239 | <i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | Hygrophore des bois | | | |
| 277 | <i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Clitocybe en entonnoir | <i>Infundibulicybe g.</i> | | |
| 292 | <i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Clitocybe anisé | | | |
| 327 | <i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith. | Omphale épingle | | Mousse | |
| 359 | <i>Laccaria tortilis</i> (Bolt.)Cooke | Laccaire tortueux | | | |
| 497,5 | <i>Marasmius bulliardii</i> Quélet | Marasme de Bulliard | | feuille de châtaigne | |
| 520 | <i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Collybie à pied en fuseau | <i>Gymnopus f.</i> | chêne | |
| 521 | <i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer | Collybie maculée | <i>Rhodocollybia m.</i> | | |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer | Collybie des chênes | <i>Gymnopus dryophilus</i> | | |
| 525 | <i>Collybia kuehneriana</i> Singer | Collybie à pied rouge | <i>Gymnopus erythropus</i> | | |
| 534 | <i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer | Collybie guêtrée | <i>Gymnopus peronatus</i> | | |
| 579 | <i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray | Mycène à pied strié | | | |
| 580 | <i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet | Mycène à pied raide | | | |
| 587 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray | Mycène en casque | | | |
| 588 | <i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet | Mycène inclinée | | | |
| 601 | <i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Mycène pure | | | |
| 612 | <i>Mycena speirea</i> (Fr.:Fr.)Gillet | Mycène groupée | | sur branche de feuillus | |
| Ordre : Agaricales | | | | | |
| 774 | <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr. | Coprin noir d'encre | <i>Coprinopsis a.</i> | pelouse | Spores 9 x 5 µm |
| 776 | <i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | Coprin pied de lièvre | <i>Coprinopsis l.</i> | | |
| 782 | <i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser | Lacrymaire velouté | <i>Lacrymaria l.</i> | | |
| Ordre : Amanitales | | | | | |
| 842 | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray | Amanite rougissante, Golmotte | | | |
| 855 | <i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray | Amanite citrine | | | |
| Ordre : Pluteales | | | | | |
| 858 | <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer | Plutée couleur de cerf | | Souche | |
| 890 | <i>Pluteus romellii</i> (Britz.)Saccardo | Plutée de Romell | | | |
| Ordre : Entolomatales | | | | | |
| 959 | <i>Entoloma sericellum</i> (Fr. : Fr.) Kummer | Entolome blanc soyeux | | | |
| 968 | <i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer | Meunier, Clitopile petite prune | | | |
| Ordre : Cortinariales | | | | | |
| 993 | <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet | Hébélome échaudé | | | |
| 1011 | <i>Inocybe dulcamara</i> (Alb.et Schweiniz)Kummer | Inocybe doux amer | | | |
| 1054 | <i>Inocybe langei</i> Heim 1931 | Inocybe de Lange | | | Spores 9 x 6 µm, cystides métuloïdes 60 x 14 µm, odeur spermatique |
| 1093 | <i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr. | Cortinaire violet | | | |
| 1229 | <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer | Pholiote changeante | | | |
| 1235 | <i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet | Tubaire furfuracée | | | |
| 1239 | <i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer | Crépidote mou | | | |
| 1243 | <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer | Crépidote variable | | sur brindilles de | Spores 6 x 3 µm |
| 1328 | <i>Conocybe tenera</i> (Schaeffer:Fr.)Kühner | Conocybe délicat | | | Spores 10-11 x 6 µm |
| Ordre : Russulales | | | | | |
| 1349 | <i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill. | Russule à lames serrées | | | |
| 1381 | <i>Russula atropurpurea</i> (Kromholz) Britzelmayer | Russule pourpre et noir | <i>R. kromholzii</i> | | |
| 1476 | <i>Russula velenovskii</i> Melzer & Zvára | Russule rouge cuivre | | | |
| 1500 | <i>Russula ochroleuca</i> Pers. | Russule ocre et blanc | | | |
| 1581 | <i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr. | Lactaire à odeur de punaise | | chêne | |
| 1595 | <i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnes) ex Hora | Lactaire des ornières | | | |
| Ordre : Boletales | | | | | |
| 1669 | <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr. | Cèpe de Bordeaux | | | |
| 1681 | <i>Boletus erythropus</i> Pers. | Bolet à pied rouge | | | |
| 1702 | <i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát | Bolet orangé des chênes | | chêne | |
| Sous-classe : Gasteromycetideae | | | | | |
| 1726 | <i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers. | Scléroderme commun | | | |
| 1728 | <i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers. | Scléroderme verruqueux | | | |
| 1735 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers. | Vesse-de-loup perlée | | | |