

Forêt de Marly, Ste-Gemme, 11 novembre 2013, 93 espèces			Commune : Feucherolles	MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaïre polymorphe			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
7,4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte		hêtre	
Classe : Pezizomycètes					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			
8,7	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
9,5	<i>Bisporella sulfurina</i> (Quél.)Carpenter	Hélotie jaune citron	<i>Calycella sulfurina</i>	sur Sordariomycètes	
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
11,5	<i>Neobulgaria pura</i> var. <i>foliacea</i> (Bresadola) Dennis & Gamund	Bulgarie pure		hêtre	
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Gro.v. & Wils.	Coryne charnue			
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
48,5	<i>Phleogena faginea</i> (Fr.:Fr.)Link	faginus (Lat.) : hêtre		hêtre	
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre		hêtre	
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable		hêtre	
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant	<i>Phaeolus rutilans</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis Fr.:Fr.</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
208	<i>Hygrocybe coccinea</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Hygrophore écarlate		pelouse	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
303,5	<i>Clitocybe deceptiva</i> Bigelow	Clitocybe anisé pâle	<i>C. suaveolens</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel		souche	
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
353	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton	Laccaire bicolore			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon		chêne	
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
500	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacquin : Fr.) Fr.	Marasme à odeur d'ail		hêtre	
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
596	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo	Mycène à lait blanc var. n.	<i>M. galopus</i> var. <i>nigra</i>		
599	<i>Mycena crocata</i> (Schrader : Fr.) Kummer	Mycène à lait orangé		hêtre	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
	Ordre : Agaricales				
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
748	<i>Agaricus essettei</i> Bon 1983	Agaric à pied bulbeux	<i>Psalliota abruptibulba</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
	Ordre : Amanitales				
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à chapeau obtus	<i>leptopus</i>		odeur de sardine
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1279	<i>Psilocybe squamosa</i> (Pers. : Fr.) Orton	Psilocybe écailleux	<i>Stropharia s.</i>		
1287	<i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.)Quélet	Hypholome couleur de briques			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux		hêtre	
	Ordre : Boletales				
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme d	<i>Lycoperdon piriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1748	<i>Mutinus caninus</i> (Hudson : Pers.) Fr.	Satyre du chien			