

Relevé mycologique

Forêt de Fausses-Reposes, 8 novembre 2014		81 espèces	Commune : Marnes-la-Coquette		MEN : 2314C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise		hêtre	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
Classe : Pezizomycètes					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Pézize orangée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
69,5	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.:Fr.)Cooke	Péniophore du chêne			
80,2	<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrader:Fr.)Pat., ss Bres.	Phellin ferrugineux	<i>Fuscoptoria ferruginosa</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>		
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laq	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon		chêne	
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Marasmius urens</i>		
545	<i>Mycena corynephora</i> Maas Geesteranus 1983	Mycène farineuse, Mycène floconneuse		Bois mort	Pied et chapeau poudrés
553	<i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode	<i>M. iodolens</i> ; <i>M. vitilis</i> ss. auct.		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourp	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i> , <i>Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée	<i>M. gracilentia</i>		
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
Ordre : Amanitales					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébelome échaudé			
1125	<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Fr.	Cortinaire anthracite			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1137	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de faon			

Relevé mycologique

1144	<i>Cortinarius rigens</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rigide			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		Spores 8,5 x 6 µm
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse			
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quél.	Strophaire vert-de-gris			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		sur souche	
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule verdâtre			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Sarnari 1998	Russule fausse pectiné	<i>Russula pectinatoides</i> Peck		
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noi	<i>R. krombholzii</i>		
1401	<i>Russula cuprea</i> (Krombh) Lge 1845	Russule cuivrée	<i>R. frondosae</i>	charme	Saveur acre ; le chapeau pourpre à centre vert olivacé le rapproche de la var. <i>rubroolivascens</i>
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux		hêtre	
1590	<i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch)Gillet	Lactaire à odeur de punaise			
1598	<i>Lactarius pterosporus</i> Romagnesi	Lactaire ridulé, Lactaire à spores ailées		hêtre	
	Ordre : Boletales				
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D.	Vesse-de-loup en form	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		