

Forêt de Sainte Apolline, 11 novembre 2012, 100 espèces			Commune : Plaisir	MEN : 2214C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Pezizomycètes					
8,1	<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch. ex Mérat) P. Karst. 1871				Cupules grises, spores 8 x 2,5 µm
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
11,5	<i>Bryoglossum gracile</i> (P. Karst) Redhead 1977		<i>Mitrulella gracilis</i> , <i>M. muscicola</i> , (<i>M. rehmi</i> d'après certains auteurs ?)	Mousse	stipe court et chapeau convexe crème ocracé
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetidae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant	<i>Phaeolus rutilans</i>		
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilât	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu		hêtre	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetidae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel		souche	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc		bouleau	
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufre			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette		chêne	
391,5	<i>Tricholoma squarrulosum</i> Bres.	Tricholome à pied écaillé			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
398	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt:Fr.)Jacobash	Tricholome ceinturé		saule	
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
474	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.:Fr.)Orton	Lyophylle enfumé, Tricholome	<i>Clitocybe fumosa</i> , <i>Lyophyllum cinerascens</i> , <i>conglobatum</i>		
499,5	<i>Marasmius prasiomus</i> (Fr.:Fr.)Fr.		<i>querceus</i>		Odeur d'ail
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau, sou	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		souche	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		souche	
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose		hêtre	
625	<i>Megacollium platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kottaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i> , <i>Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée	<i>M. gracilentia</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
Ordre : Amanitales					
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Entolomatales					
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos				Odeur de farine
974,5	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch) Singer	Rhodocybe tacheté			à confirmer
Ordre : Cortinariales					
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radicaire			
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
1097	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de Rocou		chêne	Mortel
1106.5	<i>Cortinarius turgidus</i> Fries 1838	Cortinaire renflé		hêtre	
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1129	<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire armillé		bouleau	
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1144	<i>Cortinarius rigens</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rigide			
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon			
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividoochraceus</i>	hêtre	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		bouleau	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			à confirmer
1287	<i>Hypholoma sublateralium</i> (Fr.)Quélet	Hypholome couleur de briques			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		souche	
	Ordre : Russulales				
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		bouleau	
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1566	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
	Ordre : Boletales				
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		chêne	
1703	<i>Leccinum versipelle</i> (Fr.)Snell	Bolet roux	<i>Boletus rufescens</i>	bouleau	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneum</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. K	Vesse-de-loup en forme de poi	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	souche	