

| Etang de St-Quentin, RNN entrée Sud, 22 mars 2015, 12 espèces |  |                              | Commune : Trappes          | MEN : 2214D |  |
|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| N° CD   | Espèce   | Nom français                 | Synonyme                   | Habitat     | Remarques  |
| <b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>                                    |  |                              |                            |             |  |
| <b>Classe : Sordariomycètes</b>                               |  |                              |                            |             |  |
| 7,8   | <i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann:Fr.)Karsten     | Leptosphère pointu           |                            | Ortie       |  |
| <b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>                                 |  |                              |                            |             |  |
| <b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>                         |  |                              |                            |             |  |
| 47  | <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein   | Oreille de judas             |                            | sureau      |  |
| 48  | <i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.    | Oreille mésentérique         |                            |             |  |
| <b>Classe : Homobasidiomycètes</b>                            |  |                              |                            |             |  |
| <b>Sous-classe : Aphyllorphomycetideae</b>                    |  |                              |                            |             |  |
| 66  | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.              | Stérée hirsute               |                            |             |  |
| 69,5  | <i>Peniophora quercina</i> (Pers.:Fr.)Cooke          | Péniophore du chêne          |                            | chêne       |  |
| 80,5  | <i>Phellinus tuberculatus</i> (Baumg.)Niemelä        | Phellin des arbres fruitiers | <i>P. pomaceus</i>         | Prunellier  |  |
| 89  | <i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.                 | Amadouvier                   |                            |             |  |
| 90,6  | <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter  | Tramète rougissante          | <i>Trametes rubescens</i>  |             |  |
| 92  | <i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.                | Lenzite du bouleau           | <i>L. flaccidus</i>        |             |  |
| 95  | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát             | Tramète versicolore          | <i>Coriolus versicolor</i> |             |  |
| <b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>                        |  |                              |                            |             |  |
| <b>Ordre : Cortinariales</b>                                  |  |                              |                            |             |  |
| 1315  | <i>Pholiotina aporos</i> (Kits v.Waveren)Cléménçon   | Conocybe printanier          |                            |             | Spores 8,5 x 4,8 µm sans PG, cystides cylindriques |
| <b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>                        |  |                              |                            |             |  |
| 1737,5  | <i>Langemannia gigantea</i> (Batsch:Pers.)Rostkovius | Vesse-de-loup géante         | <i>Calvatia g.</i>         |             |  |