

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, 25 octobre 2015, 157 espèces			MEN : 2216A	Commune : Dourdan (91)	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
0,1	<i>Physarum album</i> (Bull.) Chevall. 1826		nutans		
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
Classe : Leotiomycetes					
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver				
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fueckel	Pézize orangée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycetes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
56	<i>Calocera comea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère comée			
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllphoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
64,4	<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. 1960	molaris (Lat.) : molaire, meule	<i>Cerocorticium molare</i>		
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
74	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Hydne cure-oreilles		cône de pin	
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas	<i>Coriolus abietinus</i>		
100,5	<i>Postia ptychogaster</i> (Ludwig) Vesterholt		<i>Oligoporus ptychogaster</i>	pin	
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts		charme	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
236	<i>Hygrophorus arbustivus</i> (Fr.) Fr. 1836				
239	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Hygrophore des bois			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
299	<i>Clitocybe phaeoptalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
304	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch)Quélet	Clitocybe anisé rosâtre			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
353	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton	Laccaire bicolore			mycelium est bleu pâle
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
376	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Tricholome prétentieux, bise d'automne			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer	Tricholome rutilant		pin	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> C. <i>marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Marasmius urens</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i> , <i>Collybia grammoccephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Reh.)Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
629,5	<i>Oudemansiella radicata</i> var. <i>marginata</i> (Konrad & M	Mucidule radicante			
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
652	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.)Fayod	Cystoderme dents-de-requin			
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
786	<i>Psathyrella microrrhiza</i> (Lasch : Fr.) Konrad & Maublanc	Psathyrelle semi-vêtu			présence de voile sur les jeunes exemplaires
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
838	<i>Amanita jonquille</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>		
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855.5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
	Ordre : Entolomatales				
910	<i>Entoloma rhodopodium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1035	<i>Inocybe pusio</i> Karsten	Inocybe nain, Inocybe modeste			Mèches sur le chapeau et couleur violette sur le pied, cystides qui ne sont pas jaunes dans l'ammoniaque
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1056	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner				leiosporé cystidié avec mèches sur le chapeau, couleur brun moyen
1065	<i>Inocybe kuehneri</i> Stangl & Veselsky	Inocybe de Kühner	<i>I. eutheles pro parte, I. sindonia</i>		leiosporé cystidié de couleur claire
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			Odeur de <i>Pelargonium</i>
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividoochraceus</i>		
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1279	<i>Psilocybe squamosa</i> (Pers. : Fr.) Orton	Psilocybe écailleux	<i>Stropharia s.</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1294	<i>Hypholoma ericaeoides</i> Orton				
1318	<i>Pholiotina brunnea</i> (Lange & Kühner ex Watling) Singer	Conocybe brun			Couleur brun-fauve homogène, chair du pied sombre. Cheilocystides avec boule
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1366	<i>Russula raoultii</i> Quélet 1886	Russule jaune pâle, Russule de Raoult			blanche à centre jaune, lames très claires
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardeine	<i>R. sardonica</i>	pin	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule verte			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule presque bleue			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1442	<i>Russula font-queri</i> Singer 1947	Russule saumonée des bouleaux, R. de Font-Quer		bouleau	Chapeau rose roussâtre à ocre, lames aunes, chair douce, Fe rosé, Gaïac bleu
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1524	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers.:Fr.)Fr., non ss Sacc.	Lactaire pâle		hêtre	
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1566	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire déperissant			
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		pin	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1651	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Schaeffer)Bon	Bolet ferrugineux	<i>lanatus</i>		Réaction de la cuticule en vert à l'ammoniac comme <i>subtomentosus</i> , mais spores étroites (moyenne de 4,2 µm)
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilat) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Watling	Bolet craquelé	<i>Boletus luteoporus</i>		
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735.7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			