

Vaux de Cernay, 1er octobre 2016, 63 espèces		Communes : Cernay-la-Ville		MEN : 2215C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllphoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
79,4	<i>Inonotus radiatus</i> (Sowerby : Fr.) Karsten	Polypore de l'aulne		aulne	
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80,5	<i>Phellinus torulosus</i> Bourdot & Galzin	Polypore rouillé	<i>Polyporus fuscopurpureus</i>		
81,7	<i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier	Ganoderme résineux			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,3	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard:Fr.)Ryvarden	Polypore du frêne	<i>Ungulina fraxinea</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu			
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
135	<i>Lentinus torulosus</i> (Pers. : Fr.) Lloyd	Lentin coquillage	<i>Panus conchatus, P. flabelliformis</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
359	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt.)Cooke	Laccaire tortueux			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
437	<i>Melanoleuca verrucipes</i> (Fr.) Singer	Melanoleuca à pied verruqueux		Compost	
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropusC. marasmioides</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
596	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo	Mycène à lait blanc var. noir	<i>M. galopus var. nigra</i>		
608	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.)Kumm.	Mycène orange			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue			spores 4 x 2 µm
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
680,5	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange, non ss Huijsman				couleur rose ; à longs poils non cloisonnés sans sous-couche; boucles présentes
705	<i>Leucocoprinus brebissonii</i> (Godey)Locquin	Lépiote de Brébisson			
717	<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bulliard:Fr.)Kreisel	Lépiote à lames rouges		Compost	
736	<i>Agaricus langei</i> (Moeller) Moeller	Agaric de Lange			pied non bulbeux, spores > 7 µm
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>	Compost	
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	<i>Lacrymaria l.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
892	<i>Pluteus diettrichii</i> Bresadola	Plutée rimuleux	<i>Pluteus rimulosus</i>		
Ordre : Cortinariales					
983,5	<i>Alnicola umbrina</i> (Maire) Kühner	Alnicole commune		aulne	Spores 12(14) x 6 µm, saveur douce
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre		Sur bois	
Ordre : Russulales					
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			Saveur âcre
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule presque bleue			Saveur douce
1608	<i>Lactarius obscuratus</i> var. <i>radiatus</i> (Lange ex Romagnesi) Romagnesi			aulne	
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie			chair du pied bleuissante, Q > 2,7, spores striées
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		