

Forêt de Meudon, 22 octobre 2016, 64 espèces		Commune : Chaville (92)			MEN : 2314C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre		branche	
6,5	<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Xylaie à long pied			fente germinative en forme de S
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre	<i>Stereum purpureum</i>		
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme méridional	<i>G. australe</i>		grandes spores
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bonc	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycleptodon ochraceum</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> C. <i>marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Marasmius urens</i>		
545	<i>Mycena corynephora</i> Maas Geesteranus 1983	Mycène farineuse, Mycène floconneuse		Tronc moussu	Petit, blanchâtre ; masses de cellules globuleuses en brosse sur le chapeau et l'arête des lames.
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		pas de poils et spores OK
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
Ordre : Amanitales					
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
Ordre : Cortinariales					
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1039	<i>Inocybe griseolilacina</i> Lange	Inocybe gris lilas, Inocybe gris violet			Pied violet, chapeau peu foncé à squames concentriques, spores papillées
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaie voilée			spores amygdaliformes
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349,5	<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi	Russule à lames piquantes			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1476	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára	Russule de Velenovský			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1717	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.:Pers.)Morgan	Astrée hygrométrique			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme d	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			