

Forêt de St-Germain, Château du Val, 28 octobre 2016, 62 espèces		Commune : Saint-Germain-en-Laye MEN : 2214B			
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre			branche morte
6,5	<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Xylaire à long pied			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			sur feuilles d'érable
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
79,4	<i>Inonotus cuticularis</i> (Bulliard : Fr.) P. Karsten 1880	Polypore peigné, Inonotus cuticul	<i>Xanthochrous c., Polyporus fuscovelutinus, Inonotus perplexus</i>		
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
85,5	<i>Antrodia xantha</i> (Fr.:Fr.)Ryv. (non Lind.)				spores allantoïdes très étroites, chair amère
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>P. corticatus, P. tephrotrichus</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
431	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb.& Schw.:Fr.)Karsten	Ripartite poilu			
454	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühner & Maire				
458	<i>Leucopaxillus cerealis</i> (Lasch)Singer	Leucopaxille paradoxal	<i>L. paradoxus</i>		
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropusC. marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	<i>Collybia conigena</i>		
539	<i>Hemimycena mairei</i> (Gilbert)Singer	Mycène de Maire	<i>Omphalia mairei</i>	pelouse	
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		cheilocystides aiguës
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
572	<i>Mycena aetites</i> (Fr.)Quélet	Mycène couleur d'aérite (Oxyde de Fer)			lames grises
573,5	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill)Murrill	Mycène printanière			brun,odeur d'eau de javel
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		souche	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		souche	
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
813	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeffer)Maire	Psathyrelle gris-brun			
815	<i>Psathyrella artemisiae</i> (Pass.) Konrad & Mautblanc 1949	Psathyrelle squameuse	<i>squamosa</i>		Flocons blancs à la marge, cystides lagéniformes aiguës
818	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck)A.H.Smith	Psathyrelle cespiteuse			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			Chapeau ridé, spores 7 x 5,5 µm, cheilocystides fusiformes
Ordre : Cortinariales					

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			sprores globuleuses à largement elliptiques, épineuses
1287	<i>Hypholoma lateritium</i> (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Hypholome couleur de brique	<i>H. sublateritium</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1476	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára	Russule de Velenovský			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		