

Forêt de Bois-d'Arcy, 29 octobre 2016, 110 espèces		Communes : Bois-d'Arcy & les Clayes-sous Bois		MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
2,5	<i>Sepedonium chrysospermum</i> (Fr.) Heim	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i>		sur <i>Xerocomus</i>	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.) Greville	Xylaire du bois			
7,4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte		hêtre	
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.) Fr.	Helvelle crépue			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Wettstein	Oreille de judas			
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.) Fr.	Calocère cornée			
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphylophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.) Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.) Léveillé	Hymenochaete rouillé			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.) With.	Langue de boeuf		chêne	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.) Murr.	Polypore soufré			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.) Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.:Fr.) P. Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.) Fr.	Polypore élégant			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.) Karsten	Panelle styptique			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbiger</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->) Cooke	Laccaire améthyste			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.) Kummer	Tricholome blanc			
376	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.:Fr.) Quélet	Tricholome prétentieux, bise d'automne			
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.) Singer	Lépiste sordide			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.) Fr.	Marasme petite roue			
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.) Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Collybie à pied en fuseau, so	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus, C. marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.) Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Mycène à disque basal			
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet	Mycène à pied raide			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.) S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.) S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet	Mycène inclinée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Mycène à lait blanc			
596	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke) Saccardo	Mycène à lait blanc var. noire	<i>M. galopus var. nigra</i>		
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.) Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.) Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
629,5	<i>Oudemansiella radicata</i> var. <i>marginata</i> (Konrad & Maublanc)	Mucidule radicante			
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	Cystoderme amiantacé			
<b>Ordre : Agaricales</b>					
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton) Moser	Lépiote étoilée			
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini) Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.) Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
717	<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bulliard:Fr.) Kreisel	Lépiote à lames rouges			
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire	<i>A. purpurellus, A. dulcidulus</i>		
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.) Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.) S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.) Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
816	<i>Psathyrella gossypina</i> (Bulliard : Fr.) Pearson & Dennis 1948		<i>xanthocystis</i>		Chapeau brun chaud à bord voilé ; Spores 8 x 4,5 µm, cystides fusoides renflé à sommet pointu
	<b>Ordre : Amanitales</b>				
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
890	<i>Pluteus romellii</i> (Britz.)Saccardo	Plutée de Romell			Spores 6,5 x 6 µm, cystides claviformes
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos				Meunier gris
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1020	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel			
1038	<i>Inocybe cincinnata</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Inocybe à fibrilles bouclées	<i>I. phaecomis</i>		
1039	<i>Inocybe griseoilacina</i> Lange	Inocybe gris lilas, Inocybe gris violet			Spores 9,5 x 5,5 µm, cystides banales 40 x 10 µm
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1235,5	<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds	Tubaire de Romagnesi	<i>T. pellucida</i>		Spores 6,5-8 x 4,5-5,5 µm, cystides élargies au sommet
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1314	<i>Pholiotina arrhenii</i> (Fr.)Singer	Conocybe à anneau plissé			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1388	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.)Melzer & Zvára	Russule pâissante		bouleau	Gaïac faible sur le pied, bleu sur lames
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule presque bleue			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	FeSO4 gris vert
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes</i> , <i>R. rosea</i> , <i>R. incarnata</i>	hêtre	Gaïac négatif sur le pied, bleu sur lames
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépéissant			
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetidae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		