

Forêt de Rambouillet, Etang d'Or, 30 septembre 2017, 158 espèces		Commune : Rambouillet	MEN : 2215C		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
9,1	<i>Ciboria batschiana</i> (Zopf)Buchwald	Ciborie de Batsch			
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>		
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
30,1	<i>Otidea bufonia</i> (Pers. : Fr.) Boudier	Otidée peau de crapaud			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
50	<i>Tremella foliacea</i> Pers.:Fr.	Trémelle foliacée			
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllphoromycetideae</b>					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bond	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycocleptodon ochraceum</i>		
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptcephalus, Melanopus varius</i>		
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
134	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr. : Fr.) Kühner	Lentin couleur d'ours			
137	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lentin tigré		saule	
239	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Hygrophore des bois			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		spores sphériques
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc			
370	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet 1872	Tricholome disjoint			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>		
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépisite sordide			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			pilécystides digitées, nombreuses cystides pointues
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropusC. marasmioides</i>		
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovský	Mycène jaunâtre	<i>M. elegans sensu Gillet, M. luteoalba</i> var. <i>sulphureomarginata</i> J.E. Lange		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megaclollybia platyphylia</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia gramocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
672	<i>Lepiota ventriospora</i> Reid	Lépiote à spores ventrués	<i>L. metulaespora, magnispora</i>		spores en forme de spores de bolet
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
675	<i>Lepiota castanea</i> Quélet	Lépiote châtain			
678,5	<i>Lepiota tomentella</i> J. E. Lange 1923				petite, spores éperonnées, poils de la cuticule non septés
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracie	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliote solitaire	<i>A. purpurellus, A. dulcidulus</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
837	<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Poumarat	Amanite tue-mouches			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
<b>Ordre : Pluteales</b>					

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
864	<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr.: Fr.) Gillet	Plutée villeux	<i>Pluteus villosus</i> (Bull.)Quél.		
868	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée brun d'ombre			
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
<b>Ordre : Entolomatales</b>					
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>E. sinuatum</i>		
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1007	<i>Hebeloma theobrominum</i> Quadaccia 1987	Hébélome tronqué			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radifiant			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1023	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.)Quél.	Inocybe à odeur de Benjoin			rougissement net
1028	<i>Inocybe piniadora</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Inocybe à odeur de poire	<i>fraudans</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>liacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1056	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner				
1065	<i>Inocybe kuehneri</i> Stangl & Veselsky	Inocybe de Kühner	<i>I. eutheles pro parte ; I. sindonia</i>		chapeau clair, mèches
1071	<i>Inocybe umbrina</i> Bresadola	Inocybe à bulbe sphérique, l. brun d'ombre	<i>I. assimilata</i>		Spores 9 x 4,5-5,2 µm ; cystides métuloïdes fusiformes ; chapeau écaillé ; lames bordées de brun
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.: Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1125	<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Fr.	Cortinaire anthracite	<i>Dermocybe a.</i>		
1159	<i>Cortinarius varius</i> (Sch.: Fr.) Fr. 1838	Cortinaire variable			
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1188,5	<i>Cortinarius fulvoincarnatus</i> Joach. 1936				
1191	<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire roux olivacé, Cortinaire violet-pourpre			
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>		
1238	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Crépidote aplani			spores rondes, pas de couche gélatineuse
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			spores largement elliptiques, bien ponctuées
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1255	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	Pholiote des aulnes			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1328	<i>Conocybe tenera</i> (Schaeffer:Fr.)Kühner	Conocybe délicat			
<b>Ordre : Russulales</b>					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide			
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1392	<i>Russula sanguinea</i> Fr. 1838	Russule sanguine	<i>R. sanguinaria</i> (Schumac)	pin	
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1460	<i>Russula romellii</i> R.Maire	Russule de Romell			Gaiac lent mais +, chair douce, lames très fragiles
1467	<i>Russula faginea</i> Romagn.	Russule des hêtraies		hêtre	Odeur de crustacés
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Amoult & Goris	Russule coccinée			Gaiac nul
1492	<i>Russula acetolens</i> S. Rauscher 1989	Russule jaune d'oeuf	<i>R. vitellina</i>		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon	<i>lutea</i>		jaune
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers			
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté			
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques			bouleau
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant			poisetier
1553	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn. 1958	Lactaire orangé gris, Lactaire à couleur de quietus			pin
1555	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair 1950	Lactaire semi-sanguin			pin
1577,5	<i>Lactarius britannicus</i> fo. <i>pseudofulvissimus</i> Reid 1969	Lactaire soyeux			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			chêne
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1596,5	<i>Lactarius badiosanguineus</i> Kühner et Romagnesi 1954	Lactaire rouge sombre, Lactaire couleur de foie			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactair	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i> (Lange) Bon		
<b>Ordre : Boletales</b>					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1649	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet tacheté		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			verdissement de la cuticule à l'ammoniac, spores conformes
1655	<i>Xerocomus ripariellus</i> Redeuilh	Bolet des rives			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1662	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	Bolet radifiant	<i>B. albidus</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
<b>Sous-classe : Gasteromycetidae</b>					
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de p	<i>Lycoperdon piriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			