

Forêt d'Abbecourt, 1 <sup>er</sup> octobre 2017, 100 espèces		Commune : Orgeval	MEN : 2214A		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
118	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus		sous feuillus	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus C. marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		souche	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollihya platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
676	<i>Lepiota boudieri</i> Bresadola	Lépiote de Boudier			Spores éperonnées 9,5 x 3,5 µm
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	<i>Lacrymaria l.</i>		
818	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck)A.H.Smith	Psathyrelle cespéteuse			
<b>Ordre : Amanitales</b>					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa var. spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
<b>Ordre : Entolomatales</b>					
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>		
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à pied grèle	<i>leptopus, mammosum</i>		
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
983,5	<i>Alnicola umbrina</i> (Maire) Kühner	Alnicole commune		aulne	Spores 10 x 5,5 µm ; chair douce
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1028	<i>Inocybe piriodora</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Inocybe à odeur de poire	<i>fraudans</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1054	<i>Inocybe langei</i> Heim 1931	Inocybe de Lange			Spores 9 x 5,5 µm, cystides métuloïdes, odeur spermatique
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			Odeur de Pelargonium
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1239	<i>Crepidotea mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		souche	
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule verte			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté			
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1608	<i>Lactarius obscuratus</i> var. <i>radiatus</i> (Lange ex Romagnesi) Romagnesi			aulne	
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Kr	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735.5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	vesse-de-loup épineuse			
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			