

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, 29 octobre 2017, 139 espèces			MEN : 2216A	Commune : Dourdan (91)	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crêpue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycetes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
69,5	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.:Fr.)Cooke	Péniophore du chêne			
74	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Hydne cure-oreilles		cône de pin	
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : F)	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes pubescens</i> (Schumacher:Fr.)Pilát	Tramète pubescent			
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycocleptodon ochraceum</i>		
95,5	<i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers.)Kotlaba & Pouzar	Polypore denté			
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas	<i>Coriolus abietinus</i>		
100,5	<i>Postia ptychogaster</i> (Ludwig) Vesterholt		<i>Oligoporus ptychogaster</i> (Ludwig)R. & O.Falck		
107,5	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr.	Polypore cilié	<i>Leucoporus lepideus</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crêpue		pin	
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
116,5	<i>Clavulina rugosa</i> (Bulliard : Fr.) Schröter	Clavaire rugueuse	<i>Clavaria grossa</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>P. corticatus, P. tephrotrichus</i>		
239	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Hygrophore des bois			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
294,5	<i>Clitocybe fritilliformis</i> (Lasch) Gillet				
299	<i>Clitocybe phaeopecta</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
303,5	<i>Clitocybe deceptiva</i> Bigelow	Clitocybe anisé pâle	<i>C. suaveolens</i>		
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	<i>C. dicolor</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufre			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
397,5	<i>Tricholoma inocybeoides</i> Pearson				
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
577,5	<i>Mycena stipitata</i> Maas Geesteranus & Schwöbel	Mycène à odeur alcaline	<i>M. alcalina</i> (Fr. : Fr.) Kummer		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
651,2	<i>Cystoderma amianthinum</i> f. <i>rugosoreticulatum</i> (Lorin)	Cystoderme amiantacé			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	Ordre : Agaricales				
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées	<i>L. metulaespora, magnispora</i>		
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
680,5	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange, non ss Huijsman				
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Kromholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini) Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.) Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
748	<i>Agaricus essettei</i> Bon 1983	Agaric à pied bulbeux	<i>Psalliota abruptibulba</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.) S.F. Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
	Ordre : Amanitales				
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.) Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.) Pers.	Amanite tue-mouches			
838	<i>Amanita jonquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>		
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Kromholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.) S.F. Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) S.F. Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer) Kummer	Plutée couleur de cerf			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.) Kummer	Plutée couleur de lion			
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.) Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Hébélome échaudé			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radicant			
1074	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Inocybe laineux	<i>I. ovatocystis</i>		
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius</i> c.		
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.) Fr.	Cortinaire rougeâtre			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Cortinaire anormal			
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1120,5	<i>Cortinarius bataillei</i> (Favre ex Moser) Hoiland		<i>Dermocybe</i> b.		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>	hêtre	
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.) Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Crépidote variable			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes			
1296,5	<i>Agrocybe rivulosa</i> Nauta 2003				
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->) Fr.	Russule noirissante			
1354,5	<i>Russula subfoetens</i> W. G. Smith 1973	Russule fausse-fétide	<i>R. foetens</i> var. <i>minor</i>		
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1393	<i>Russula sardonia</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardoine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1418	<i>Russula violeipes</i> Quélet. 1898	Russule à pied violet			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->) Fr.	Russule grise			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.) Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.) Gray	Lactaire délicieux		pin	
1576,5	<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.: Fr.) Gray	Lactaire orangé, lactaire à lait très doux			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire camphré			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		pin	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.) Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.) Fr.	Paxille enroulé			
1617	<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr.	Gomphide rose		pin	
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.) Roussel	Nonnette voilée		pin	
1649	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet tacheté		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.) Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> v.	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetidae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.) Willdenow	Cyathe strié			