

Forêt de Beynes, 25 novembre 2018, 75 espèces		Commune : Beynes		MEN : 2214C	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ZYGOMYCOTA					
0,2	<i>Anthina flammea</i> Fr.			hêtre	
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
4	<i>Hypoxyton fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxyton en forme de fraise		hêtre	
7	<i>Xylaria hypoxyton</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
Classe : Leotiomycetes					
9,2	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pézize ferme	<i>Poculum firmum</i>		
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
51	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Exidie glanduleuse			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllphoromycetideae					
61,6	<i>Phlebia merismoides</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Plébie orangée	<i>radiata, aurantiaca</i>		
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
74	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Hydne cure-oreilles		cône de pin	
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		chêne	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu		hêtre	
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
147	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacquin:Fr.)Kummer	Pleurote en huître			
287	<i>Lepista inversa</i> (Scop.)Patouillard	Clitocybe inversé		pin	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>	chêne	
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue-de-souris	<i>Collybia conigena</i>	sur cônes de pin	
549	<i>Mycena amicta</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène poudrée, M. iris			
552	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Mycène corticole bleue		Tronc moussu	
553	<i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode	<i>M. iodolens</i>		
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovský	Mycène jaunâtre, Mycène bordée de	<i>M. elegans</i> , <i>M. luteoalba</i> var. <i>sulphureomarginata</i>		
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens</i> , <i>M. oortiana</i>		
561	<i>Mycena pterigena</i> (Fries) P. Kummer (1871)	Mycène des fougères	<i>M. stipularis</i>	rachis de feuilles mortes de fougères	
562	<i>Mycena capillaripes</i> Peck	Mycène à pied chevelu			
570,5	<i>Mycena capillaris</i> (Schumacher : Fr.) Kummer				
577,5	<i>Mycena stipata</i> Maas Geesteranus & Schwöbel	Mycène à odeur alcaline	<i>M. alcalina</i>	pin	
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracieuse	<i>M. rickenii</i>		
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
	Ordre : Amanitales				
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
1068	<i>Inocybe hirtella</i> Bresadola	Inocybe à odeur d'amande amère			Spores 10-13 x 6 µm, cystides fusoides, métuloïdes
1106,5	<i>Cortinarius turgidus</i> Fries 1838	Cortinaire renflé		hêtre	Pied bulbeux radicant
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1228,5	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H.Smith & Singer				
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			