

Forêt de St-Germain, Château du Val, 11 octobre 2019, 43 espèces		Commune : Saint-Germain-en-Laye MEN : 2214B			
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaria améthyste			
458	<i>Leucopaxillus cerealis</i> (Lasch)Singer	Leucopaxille paradoxal	<i>L. paradoxus</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> C. marasmioides		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
599	<i>Mycena crocata</i> (Schradler : Fr.) Kummer	Mycène à lait orangé			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
696	<i>Sericeomyces serenus</i> (Fr.)Heinemann	Lépiote sereine			
704,1	<i>Leucoagaricus holosericeus</i> (Fries) M.M. Moser (1967)				
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barta) Bellu & Lanzo	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
749	<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	Agaric orné			
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse	<i>speciosa</i>		
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiotte changeante			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre			
Ordre : Boletales					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			