

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, 20 octobre 2019, 80 espèces			MEN : 2216A	Commune : Dourdan (91)	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
28,5	<i>Peziza repanda</i> Pers.	Pézize sinuée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
100,5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris			
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster, Melanopus forquignoni</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer	Tricholome rutilant		pin	
431	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schw.:Fr.)Karsten	Ripartite poilu			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropusC. marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventrues	<i>L. metulaespora, magnispora</i>		
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
709	<i>Macrolepiota excoriata</i> (Sch. : Fr.) Wasser	Lépiote excoriée			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & L	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
754,5	<i>Agaricus velenovskýi</i> Pilát	Agaric jaunissant f. grise	<i>A. xanthodermus</i> var. <i>griseus</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
808	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeffer ->Kummer)Singer	Psathyrelle couleur chair			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1212	<i>Gymnopilus bellulus</i> (Peck) Murrill (1917)				
1220	<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.)Singer		<i>Galerina rubiginosa</i> à 4 spores		
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.				
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			