

Relevé mycologique

Forêt de Fausses-Reposes, 2 novembre 2019		100 espèces	Commune : Marnes-la-Coquette		MEN : 2314C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		hêtre	
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue		hêtre	
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompet	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laq	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc		chêne	
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufre			
391	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chevalier->) Saccardo	Tricholome squameux			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé		hêtre	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fusee	<i>Gymnopus f.</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère		tronc moussu	
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourp	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
612	<i>Mycena speirea</i> (Fr.:Fr.)Gillet	Mycène en petits groupes			
625	<i>Megacollihya platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
Ordre : Agaricales					
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventru	<i>L. metulaespora, magnispora</i>		
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
775	<i>Coprinus romagnesianus</i> Singer	Coprin squamuleux	<i>Coprinopsis r.</i>		

Relevé mycologique

780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigé	<i>I. rimosa</i>		
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		
1095,5	<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr.	Cortinaire verdâtre			Odeur de persil
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant		hêtre	
1185	<i>Cortinarius splendens</i> R. Henry1939	Cortinaire splendide, Cortinaire jaune d'œuf		hêtre	
1194	<i>Cortinarius croceocaeruleus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Cortinaire bleu jaunissant		hêtre	Chair très amère
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividoochraceus</i>	hêtre	
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	
1529,2	<i>Lactarius zonarius</i> f. <i>scrobipes</i> (Kühner & Romagnesi)	Lactaire zoné		chêne	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoi	<i>Boletus cramesinus</i>		
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1664	<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeffer	Bolet appendiculé			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			