

Forêt de Bois-d'Arcy, 3 novembre 2019		91 espèces	Commune : Bois-d'Arcy	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué			Spores ovales
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
391,5	<i>Tricholoma squarrulosum</i> Bres.	Tricholome à pied écaillé			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
467,5	<i>Lyophyllum semitale</i> (Fr.) Kühn. 1994	Tricholome salissant, Trichol	<i>Clitocybe semitalis</i>		spores elliptiques lisses
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropusC. marasmioides</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammacephala</i>		
Ordre : Agaricales					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii (Vel.) Bellu & Lanzoni</i>		
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	<i>Pluteus lutescens</i>		
	Ordre : Entolomatales				
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i>		
	Ordre : Cortinariales				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1078	<i>Inocybe paludinella</i> (Peck)Saccardo	Inocybe des marais			
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1137	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de faon			
1157,5	<i>Cortinarius cumatilis</i> var. <i>robustus</i> (Moser) Quadraccia	Cortinaire bleu violet			ou <i>durissimus</i> (bulbe marginé)
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1206	<i>Cortinarius mucifluus</i> Fr. ss Fr. (non Ic.Sel.1867)	Cortinaire à mucus fluide			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule presque bleue			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	
1476	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára	Russule de Velenovský			
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>R. rosea</i>		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	Ordre : Boletales				
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramois	<i>Boletus cramesinus</i>		
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653,5	<i>Xerocomus pruinaeus</i> (Fr.)Quélet	Bolet prumineux			
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		