

Parc de Marly, 21 décembre 2019		30 espèces	Commune : Marly-le-Roi	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas		sureau	
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
174	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wülf.:Fr.)Kovalenko	Hygrophore blanc	<i>C. niveus</i> , <i>Hygrocybe virgi</i>	pelouse	
175	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i> (Berkeley & Miller)Bon	Hygrophore à odeur de cuir de Russie		pelouse	
176,5	<i>Cuphophyllus virgineus</i> var. <i>ochraceopallidus</i> (P.D. Orton) P. Roux (2006)		<i>Cuphophyllus ochraceopal</i>	pelouse	Basides 45-50x6 µm
211	<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen:Fr.)Kummer	Hygrophore céracé		pelouse	
214,5	<i>Hygrocybe insipida</i> (Lange)Moser	Hygrophore insipide		pelouse	Spores 7 x 4,5 µm cylindriques
228	<i>Hygrocybe psittacina</i> (Schaeffer:Fr.)Kummer	Hygrocybe perroquet		pelouse	
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>		
303	<i>Clitocybe fragrans</i> (Withering:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé strié			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
454	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühner & Maire			pelouse	
474	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.:Fr.)Orton	Lyophylle enfumé, Tricholome cendré	<i>conglobatum</i>	pelouse	Spores globuleuses ø 6,2 µm ; proche de L. decastes, il s'en différencie par les lames devenant ocracées à la manipulation
Ordre : Entolomatales					
920	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.)Moser	Entolome à pied hérissé	<i>Rhodophyllum mammosus</i>		
920,5	<i>Entoloma kuehnerianum</i> Noordeloos (1985)			pelouse	Spores 11,5 x 8-8,5 µm à 5-6 angles, odeur rance (sardine), chapeau 2-3 cm foncé à petit mamelon pointu, pied 5 cm. Proche de hirtipes (chapeau plus grand, pied plus élancé, habitat forestier alors que <i>kuehnerianum</i> est prairial). La description de Noordeloos précise pied égal au diamètre du chapeau, ce qui n'est pas le cas ici mais l'illustration Bull. SMF112 pl. 309 correspond bien
Ordre : Cortinariales					
1218	<i>Galerina heterocystis</i> (Atkinson) A.H.Smith & Singer	Galère à cystides polymorphes	<i>G. clavata</i>	pelouse	Spores 14 x 7,7 µm sans PG, basides tétra, cystides lageniformes capitées, chapeau strié ocre orangé, pied ocre
1219	<i>Galerina graminea</i> (Velenovský) Kühner	Galère des graminées	<i>G. laevis</i>	pelouse	
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		Spores 8x5 µm
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1315,5	<i>Pholiotina sulcata</i> Arnolds & Hauskn. (2003)		<i>Conocybe plicatella</i> ; ? <i>Galerina plicatella</i> ; ? <i>Bolbitius luteolus</i>	pelouse	Pied blanc pruineux en haut, Spores 9,4 x 5,7 µm sans PG net, baside tétra, chapeau 1-2 cm strié sur les 3/4
1328	<i>Conocybe tenera</i> (Schaeffer:Fr.)Kühner	Conocybe délicat			Spores 10-13(14) x 6-7,5 µm, chapeau 1,5-2,5 cm, caulo lécythiformes capitées
1337	<i>Panaeolus ater</i> (Lange)Kühner & Romagnesi	Panéole sombre			Spores 12,8 x 8 µm à PG net central, basides tétra
1342	<i>Panaeolus foenicicii</i> (Fr.:Fr.)Kühner	Panéole des moissons		pelouse	
Ordre : Russulales					
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			