

Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 27 juin 2020, 24 espèces		Commune : L'Etang-la-Ville		MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
4	<i>Hyoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hyoxylon en forme de fraise		hêtre	
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Not.	Daldinie concentrique			
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
80.4	<i>Phellinus nigricans</i> (Fr. : Fr.) Karsten	Polypore noirissant			
80.7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			sur chêne, bouleau...
90.5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95.1	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen:Fr.)Lloyd	Tramète hirsute			
95.2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu		hêtre	verte (algues) et poilue
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
106.5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)F	Polypore élégant			base du pied noire
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
Ordre : Agaricales					
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Russulales					
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			Chapeau crème, gris-brun au centre. Petit spécimen de 3,8 cm de diamètre, environ 3,5 cm de haut. Chapeau creusé au centre (infudibuliforme). Chair rougissante au grattage, puis noirissante après dix à quinze minutes. Lames très fines et très serrées, plutôt lardacées. Pas de cannelure en bord de chapeau. Présence d'un odeur mais difficile à caractériser, pas désagréable. Cuticule détachable. Gaiac ++++ sur pied et lames, d'un bleu presque noir! Fer vert foncé virant rapidement au noir. Chair amère et très piquante dans les lames
1360.5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			Chapeau gris, foncé au centre, en forme d'entonnoir avec bord relevé et cannelé, 4cm de diamètre, 5 cm de haut. Cuticule détachable. Gaiac ++ à +++ sur pied et lames. Fer ocre orangé. Lames crème, lardacées, plutôt épaisses, au nombre de 11 au cm. Pied creux. Odeur de topinambour
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		Chapeau rouge vif et foncé au centre, lames blanches cassantes, chair très dure, pied blanc taché de rouge. Pas d'odeur particulière. Chair douce. Gaiac +++ sur lames et pied. Fer nul
1489	<i>Russula lilacea</i> Quélet, 1876	Russule lilas		charme	Chapeau rose foncé, violet et jaune au centre. Fines cannelures. Gaiac + sur pied et +++ sur lames. Fer ocre à saumon. Phénol chocolat (2 min). Test sulfo-aldehydique négatif. Cuticule détachable, chair blanche dessous. Lames lardacées, blanches, fines et serrées, 15 au cm. Chair blanche immuable, saveur douce. Pied plutôt creux. Pas d'odeur.
Ordre : Boletales					
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			pores très jaunes polygonaux, chair jaune, chapeau crquelé: . Chair jaune non bleuisante, pore faiblement bleuisants
1653.8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie	<i>Xerocomellus c.</i>		fortement bleuisant au niveau des pores
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cépe bronzé			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	mycorrhizique, lié au charme