

Croix de Nemours, 20 juin 2021, 75 espèces		Commune : Saint-Arnoult (78) et Dourdan (91) MEN : 2216A			
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
0,1	<i>Ceratiomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
	<i>Mycogone rosea</i> Link				
2,5	<i>Hypomyces rosellus</i> (Alb. & Schw.) Tul.				
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise			
4,5	<i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bulliard : Fr.) Kuntze		<i>Hypoxylon nummularium</i>		
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique			
7,4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte			
7,4	<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. ex Fr.) Cke.	Diatrype du chêne			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
51	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Exidie glanduleuse			
51,1	<i>Exidia truncata</i> Fr.:Fr.	Exidie tronquée			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
60,1	<i>Aleurocystidiellum disciforme</i> (DC.:Fr.)Boidin & al.				
62	<i>Merulopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Gins	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
64,4	<i>Cerocorticium molare</i> (Chaillat ex Fr.:Fr.) Jülich & Stalper	molaris (Lat.) : molaire, meule	<i>Radulum m., Radulomyces molaris</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse	<i>Stereum fasciatum</i>		
69,5	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.:Fr.)Cooke	Péniophore du chêne			
75,9	<i>Laxitextum bicolor</i> (Persoon) Lentz 1956		<i>Thaetaephora fusca</i> Schrader ex J.F. Gmelin 1792		
79,5	<i>Inonotus obliquus</i> (Pers.:Fr.) Pilát	Polypore incrusté, Polypore cendré			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu			
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster, Melanopus forquignoni</i>		
107,5	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr.	Polypore cilié	<i>Leucoporus lepideus</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
111,2	<i>Cantharellus pallens</i> Pilat 1951	Girolle pruneuse	<i>C. subpruinus</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
834	<i>Amanita batarrae</i> (Boudier) Bon 1985	Amanite à cocarde	<i>umbrinolutea</i>		
838	<i>Amanita jonquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>		
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
840	<i>Amanita ellae</i> Quélet	Amanite isabelle			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
844	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini)Quélet	Amanite épineuse			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vail.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	<i>Pluteus lutescens</i>		
Ordre : Cortinariales					
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1018,5	<i>Inocybe obsoleta</i> (Romagnesi ex Quadaccia & Lunghini)	Inocybe fastigié var. blanche	<i>I. rimosa</i> var. <i>obsoleta</i>		
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tacheté			
1288	<i>Hypoholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypoholome en touffes			
1299	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Agrocybe précoce			
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>		
Ordre : Russulales					
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereaui</i> Maire	Russule charbonnière verte			
1410	<i>Russula langei</i> Bon 1970	Russule charbonnière à pied dur			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. incarnata, R. rosea, R. velutipes</i>		
Ordre : Boletales					
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet subtomenteux			
1655	<i>Xerocomus porosporus</i> Imier	Bolet fissuré			
1664	<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeffer	Bolet appendiculé			
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cépe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>		
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Wating	Bolet craqué	<i>Leccinellum crocipodium, Boletus luteoporus</i>		
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			