

Etang Rompu, 27 juin 2021, 36 espèces		Commune : St-Léger-en-Yvelines		MEN : 2115D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	MYXOMYCETES				
0,1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Ceratiomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
	DIVISION ASCOMYCOTA				
	Classe : Leotiomycetes				
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			possible aeruginosa
	DIVISION BASIDIOMYCOTA				
	Classe : Phragmobasidiomycetes				
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
	Classe : Homobasidiomycetes				
	Sous-classe : Aphyllophoromycetideae				
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster</i> , <i>Melanopus forquignoni</i>		
107,5	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr.	Polypore cilié	<i>Leucoporus lepideus</i>		
111,2	<i>Cantharellus pallens</i> Pilat 1951	Girolle pruineuse	<i>C. subpruinus</i>		
	Sous-classe : Agaricomycetideae				
	Ordre : Tricholomatales				
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (P)		possible laccata
495	<i>Marasmius epiphyllus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Marasme des feuilles			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
	Ordre : Agaricales				
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
573,5	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill)Murrill	Mycène printanière		litière, sous feuillus	spores cylindriques guttulées 8-10x4-4,5. cheilocistides ventruées pointues. Odeur raphanoïde. Pied gris sombre à sommet pâle. Lames adnées blanc gris
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>	S	
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis</i>	S	
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
	Ordre : Amanitales				
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
842,5	<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulfurea</i> Gillet	Amanite rougissante variété à anneau jaune			
	Ordre : Cortinariales				
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			
1299	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Agrocybe précoc			
1341	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.)Quélet	Panéole à marge dentée			
	Ordre : Russulales				
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereaui</i> Maire	Russule charbonnière verte			sans réaction au FeSO4
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			couleur rose jambon
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
	Ordre : Boletales				
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>		
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			trouvé aussi à l'état d'œuf