

Forêt domaniale de Bois d'Arcy - 10 Octobre 2021		82 espèces	Commune : Bois d'Arcy	MEN : 2214D	
en gris: récolte coté Fleury / Les Clayes					
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,2	<i>Spinellus fusiger</i> (Link) Tiegh.	Spinelle en fuseau		<i>collybia dryophila</i>	longs filaments translucides terminés par une boule noire
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
30,1	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee 1895	Otidée couleur de cuir		peuplier	Spores biguttulées 13.5-16 x 6-7 µm; asques L 170-185-195-210-225 ø 10-11 µm, bouclées. Paraphyses en crosse d'évêque
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : <i>Aphylophoromycetidae</i>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	Fr.:Fr.		juvéniles
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : <i>Agaricomycetidae</i>					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g. viridis</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck	chêne	
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> , <i>C. marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Marasmius urens</i>		
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			odeur de radis
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzo	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			odeur de radis, de pomme de terre crue
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion			
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigé	<i>I. rimosa</i>		
1076	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Inocybe à chapeau zoné			
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe		chêne	
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon			odeur de miel
1171	<i>Cortinarius caeruleus</i> (Schaeffer) Fr.	Cortinaire bleu			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>	hêtre	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1288	<i>Hypoholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Samari 1998	Russule fausse pectinée	<i>Russula pectinatoides</i> Peck		
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		

1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>pelteaeui</i> Maire	Russule charbonnière verte			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule à lames fourchues (<i>R. verte</i>)			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose	Russule comestible	chêne	
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante			
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnout & Goris	Russule coccinée			Lames jaunes IV, Gaïac ++ sur lames 0 sur pied, pied moelleux, chapeau 5 cm rouge rosé à centre décoloré (en général, les ex sont plus grands et plus rouge)
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant			
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise			
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux		hêtre	
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactaire non zoné	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i> (Lange) Bon		
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	<i>Imleria badia</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé			
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn (2015)		
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		fin de saison, tous les exemplaires sont moisiss
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			