

Forêt de Marly, Etoile aimable, 20 octobre 2021		74 espèces	Commune : Fourqueux		MEN : 2214B
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bo	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
353	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton	Laccaire bicolore			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé		hêtre	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus, C. marasmioides</i>		
573,5	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill)Murrill	Mycène printanière		Souche	Lames gris clair, pied gris brun sombre exsudant un lait transparent, chapeau brun gris strié, odeur faible
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		Odeur de radis
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			Odeur de radis
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
Ordre : Amanitales					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
Ordre : Entolomatales					
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>		
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			odeur de Pelargonium
1161	<i>Cortinarius largus</i> Buxb.ex Fr.	Cortinaire large		hêtre	Chapeau jaune, lames lilas
1163	<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> R. Henry ex Orton 1960	Cortinaire brun violet			Chapeau →9 cm, violet lilas, pied clair à cortine abondante, lames crème devenant ocre, odeur légèrement terreuse, chair blanche KOH jaune. Gaïac bleu
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Sarnari 1998	Russule fausse pectinée	<i>Russula pectinatoides</i>		
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1418	<i>Russula violeipes</i> Qué. 1898	Russule à pied violet			Odeur de topinambour
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes, R. rosea, R. incarnata</i>		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		chêne	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i>	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux		hêtre	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	<i>Imleria badia</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge	<i>Neoboletus erythropus</i>		
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var.	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		