

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	DIVISION ASCOMYCOTA				
	Classe : Pezizomycetes				
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
28,3	<i>Peziza varia</i> (Hedwig : Fr.) Fr.	Pézize variée		bois mort	Pézize de 5x3 cm, isolée, sur branche morte de bois élagué l'an dernier. Pas de lait à la cassure. Blanchit à l'extérieur en séchant. Asques octosporées, J+. Spores elliptiques, lisses, avec qq 'microguttules' en troupe aux pôles à peine visibles à l'objectif x100 huile. Spores non mûres, aucune hors des asques. 15-17x7-8µm. Paraphyses filiformes (3.5µm) septées, un peu plus larges à l'extrémité (5µm)
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuekel	Pézize orangée			
	DIVISION BASIDIOMYCOTA				
	Classe : Homobasidiomycetes				
	Sous-classe : Aphyllophoromycetideae				
63	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrader) Nakasone & Burdsall	Mérule tremblante	<i>Merulius tremellosus</i>		
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>P. faginea</i>		
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse	<i>Stereum fasciatum</i>		
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
115	<i>Arctomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornona pyxidata</i>		
	Sous-classe : Agaricomycetideae				
	Ordre : Tricholomatales				
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>C. hydrogramma</i> , <i>Singerocybe phaeophthalma</i>		
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonin, Halling & Noordeloc	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>		
534	<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Collybia peronata</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
608	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.)Kumm.	Mycène orange			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
628	<i>Xerula pudens</i> (Persoon) Singer	Collybie à poils ras	<i>Oudemansiella pudens</i> , <i>O. longipes</i>		
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
	Ordre : Agaricales				
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
774	<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin noir d'encre	<i>Coprinus atramentarius</i>	pelouse	
776	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fries) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinus lagopus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
790	<i>Parasola conopilus</i> (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	<i>Psathyrella conopilus</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Poumarat	Amanite tue-mouches			
841	<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i> (Fries) Neville & Poumarat	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
882	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagnesi	Plutée saturé			Spores 6,5x5,8 µm. Chapeau brun clair. Cystides utrifformes.
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos	Meunier gris			
974,5	<i>Clitocella mundula</i> (Lasch) K.L. Kluting, T.J. Baroni & Bergema	Rhodocybe tacheté	<i>Rhodocybe mundula</i>		
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radifiant			
1020	<i>Inosperma cookei</i> (Bresadola) Matheny & Esteve-Raventós	Inocybe à odeur de miel	<i>Inocybe cookei</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe subiliciana</i> Matheny & A. Voitek	Inocybe à lames terreuses var. <i>lilas</i>	<i>I. geophylla</i> var. <i>lilacina</i>		
1083	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet	Inocybe à pied blanc			chapeau finement fibrilleux, pied blanc, grande taille: chapeau 6.5 cm de diamètre, pied 11 cm de ht et 1.3 cm de diam. Pied bulbeux. Spores en étoile et allongées 9-11x7µm, cystides métalloïdes 40-65µm. Doute possible avec <i>Inocybe margaritispora</i> qui correspond mieux microscopiquement, mais manque les squames sur le chapeau

1173.5	<i>Cortinarius collocandoides</i> Reumaux		<i>C. purpurascens</i> var. <i>largusoides</i>	chêne	chair devenant violette, lames bleu ocre se tachant de violet au froissement, chapeau couvert de fibres radiales, pied bulbeux non marginé
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante			spores 6-7x4-5µm, pore germinatif. Cystides lageniformes biscornues cf BK4 434 page 338
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243.5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			Spores presque globuleuses
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse		terre	
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote tuberculeuse			Spores 8,2 x 5 µm phaséolées
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1297	<i>Cyclocybe erebia</i> (Fries) Vizzini & Matheny	Agrocybe brunâtre	<i>Agrocybe erebia</i>		Spores 12 x 6 µm, chapeau brun
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noircissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1350	<i>Russula delicata</i> Fr.	Russule sans lait			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Sarnari	Russule fausse pectinée	<i>R. pectinatoides</i>		chair douce, Gaïac fort
1360.5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			chair piquante, Gaïac fort
1368	<i>Russula luteotacta</i> Rea	Russule jaunissante			
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betularum</i>		
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émetique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	Gaïac fort
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i> , <i>R. undulata</i> (nom prioritaire)		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule à lames fourchues			
1412.5	<i>Russula heterophylla</i> f. <i>adusta</i> Lange	Russule à lames fourchues			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose			
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule bleu-vert			Gaïac lent et faible, verdâtre, sur pied et lames
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1453	<i>Russula tinctipes</i> Blum ex Bon	Russule à pied teinté			Sosie de <i>R. pseudointegra</i> mais Gaïac fort sur lames et pied
1460	<i>Russula romellii</i> R.Maire	Russule à lames fragiles		hêtre	
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule écrevisse des chênes		chêne	FeSO4 vert
1478	<i>Russula laeta</i> J. Schaeffer	Russule gaie	<i>R. borealis</i>		Gaïac fort, FeSO4 orange pâle, chapeau rose orangé à centre plus clair, revêtement séparable, jaune, pied blanc, lames jaunes
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes</i> , <i>R. rosea</i>		Gaïac nul sur pied, ++ sur lames
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1507	<i>Russula aurea</i> Pers.	Russule dorée	<i>R. aurata</i>		
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers			
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné			
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant		noisetier	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
1601	<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire fuligineux, Lactaire enfumé	<i>Galorrhoeus fuliginosus</i>		Chapeau brun foncé veloute, pied blanchâtre
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramois	<i>Pulveroboletus cramesinus</i>		
1652	<i>Rheubarbariboletus armeniacus</i> (Quélet) Vizzini, Simonini & C	Bolet abricot	<i>Xerocomus armeniacus</i>		FeSO4 vert sur bas du pied
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i> , <i>N. luridiformis</i> (LP811 mais non valid.)		
1702	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé des chênes	<i>L. quercinum</i>		
1713	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy & Estadès	Bolet rude gris-brun	<i>L. brunneogriseolum</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Persoon	Scléroderme commun			
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bulliard) Persoon	Scléroderme verruqueux			
1735.7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			