

Forêt de Rambouillet, étang du Coupe-Gorge, 30 octobre 2022, 98 espèces		Commune : Rambouillet	MEN : 2215C		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
22	<i>Helvella macropus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Helvelle à long pied			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphylophoromycetideae</b>					
63	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schradler) Nakasone & Burdsall	Mérule tremblante	<i>Merulius tremellosus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-mouton roux			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,2	<i>Trametes pubescens</i> (Schumacher:Fr.)Pilát	Tramète pubescente			
100,5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris	<i>Oligoporus tephroleucus</i>		Saveur douce
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
275	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bulliard) Harmaja	Tête de moine	<i>Clitocybe geotropa</i>		
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
287	<i>Paralepista inversa</i> (Scopoli) Raitelhuber	Clitocybe inversé	<i>Lepista inversa</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaria améthyste			
363,5	<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>squamosum</i> (Cooke)Rea				Pied et chapeau squamuleux
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bulliard) Gillot & Lucand	Tricholome jaune et brun	<i>T. flavobrunneum</i>	bouleau	
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i>		
521	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Albertini & Schweinitz) Singer	Collybie maculée	<i>Collybia maculata</i>		
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
<b>Ordre : Agaricales</b>					
711	<i>Macrolepiota rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni	Lépiote gracile	<i>M. gracilentia</i>		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
808	<i>Homophron spadiceum</i> (P. Kummer) Örstadius & E. Lars	Psathyrelle couleur chair	<i>Psathyrella spadicea</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		pin ou bouleau	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> f. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
<b>Ordre : Entolomatales</b>					
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			Odeur de farine
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
1041,5	<i>Inocybe tenuicystidiata</i> E. Horak & Stangl		<i>I. obscurobadia, I. leptocystis</i>		Odeur spermatique, spores 9 x 5 µm, cystides métuloïdes fusiformes 60 x 13-17 µm
1092	<i>Cortinarius caperatus</i> (Persoon) Fries	Pholiote ridée	<i>Rozites caperatus</i>		Pruine au milieu du chapeau
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1097	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	Cortinaire couleur de Rocou			chapeau roux feutré
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1137,5	<i>Cortinarius safranopes</i> Henry	Cortinaire à pied safrané			spores 8,5 x 5,5 µm, KOH violet noir en bas du pied
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon	<i>C. melliolens</i>		Odeur de miel
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>C. lividochraceus</i>		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1316	<i>Pholiotina rugosa</i> (Peck) Singer		<i>P. filaris</i> var. <i>rugosa</i> , <i>Conocybe pusilla</i>		Chapeau ridé, anneau membraneux au milieu du pied
<b>Ordre : Russulales</b>					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1394	<i>Russula torulosa</i> Bresadola	Russule des pinèdes, Russule à pied bleu		pin	
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose		chêne	
1422	<i>Russula aeruginea</i> Lindblad ex Fr.	Russule vert-de-gris	<i>R. graminicolor</i>	bouleau	Gaïac +++ , tâches rouille sur chapeau vert
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule bleu-vert			Gaïac très lent
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1498	<i>Russula amethystina</i> Quélet	Russule améthyste		pin	Chapeau violet, fines cannelures au bord. Gaïac 0 sur pied et ++ sur lames, FeS04 orange pâle. Cuticule détachable. Lames jaunes. Chair blanche immuable, saveur douce. Pied plutôt creux. Pas d'odeur.
1499	<i>Russula turci</i> Bresadola	Russule cocardée		pin	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		bouleau	
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	Chapeau mamelonné
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison		bouleau	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1541	<i>Lactarius necator</i> Persoon	Lactaire plombé	<i>L. plumbeus</i>	bouleau	
1547	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire trivial		bouleau	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			Odeur de Pelargonium
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1589	<i>Lactarius seriffuus</i> (DC. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait séreux			Odeur de punaise
<b>Ordre : Boletales</b>					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1612	<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	Paxille à pied noir	<i>Paxillus atrotomentosus</i>	pin	
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bulliard) Šutara	Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i>	pin	
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner)	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>	chêne	Cf. photo
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i>		
1702	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé des chênes	<i>L. quercinum</i>	chêne	
1706	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšík	Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i>	charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy & Estadès	Bolet rude gris-brun	<i>L. brunneogriseolum</i>	bouleau	
<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>					
1730	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.	Calvatie en coupe	<i>Calvatia excipuliformis</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			