

Réserve naturelle nationale des étangs et rigoles d'Yveline, 5 novembre 2022, 60 espèces					Commune : Trappes	MEN : 2214D		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques	RNN	Hors	
DIVISION ASCOMYCOTA								
Classe : Erysiphomycetes (oïdiums)								
1	<i>Phyllactinia fraxini</i> (de Candolle) Fuss	Oïdium du frêne	<i>Erysiphe fraxini</i>	Fraxinus excelsior		✓		
Classe : Sordariomycetes								
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique		Frêne		✓		
Classe : Leotiomycetes								
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>			✓		
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kan. & al.	Pézize turquoise				✓		
DIVISION BASIDIOMYCOTA								
Classe : Pucciniomycetes (rouilles)								
46,9	<i>Puccinia glechomatis</i> de Candolle			Glechoma		✓		
46,9	<i>Puccinia malvacearum</i> Montagne	Rouille de la mauve commune		Malva neglecta		✓		
Classe : Phragmobasidiomycètes								
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Wettstein	Oreille de judas		sureau		✓		
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée	<i>Naematelia aurantia</i>	Sur Stereum		✓		
Classe : Homobasidiomycetes								
Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae								
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.) Fr.	Stérée hirsute				✓		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.) Fr.	Amadouvier		bouleau		✓		
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.) Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	saule	et hors RNN sous saules	✓	✓	
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & Singer	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i>	Merisier		✓		
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.:Fr.) P. Karst.	Tramète brûlée				✓		
Sous-classe : Agaricomycetideae								
Ordre : Tricholomatales								
275	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bulliard) Harmaja	Tête de moine	<i>Clitocybe geotropa</i>				✓	
287,5	<i>Paralepista flaccida</i> (Soweryby) Vizzini	Clitocybe inversé des feuill	<i>Lepista flaccida</i>			✓		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe des feuilles	<i>C. cerussata</i>			✓		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel				✓		
326	<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling	Omphale de Ricken	<i>Phaeotellus rickenii</i> , <i>Ca.</i>	Mousse			✓	
410,5	<i>Tricholoma quercetorum</i> Contu	Tricholome brûlé		chêne	sous chênes, pas ustale	✓		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.) Singer	Lépiste sordide				✓		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.) Fr.	Marasme petite roue				✓		
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard				✓		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.) Singer	Marasme des ramilles				✓		
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>			✓		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>			✓		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet	Mycène à pied raide				✓		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.) S.F. Gray	Mycène en casque			spores largement elliptiques 8-9x6µm, cystides en brosse de 45µm. Dans la mousse sur bois mort. Pied gris lisse, blanc au sommet. Lames grises, interveinées, chapeau gris brun mamelonné et strié	✓		
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.) Maire	Rhodotus palmé			odeur d'abricot	✓		
Ordre : Agaricales								
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.) Kummer	Lépiote crêtée					✓	
683	<i>Lepiota brunneoincarnata</i> Lange	Lépiote brun rose		prairie	Spores 9,5 x 5-6 µm		✓	
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.) Singer	Coulemelle, Lépiote élevée				✓		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.) Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>			✓		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire	<i>A. purpurellus</i> ?, <i>A. dulcidulus</i>			✓		
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genevier	Agaric jaunissant					✓	
769	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i>		Spores 6-9 x 5-6 µm mitriformes	✓		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.) Pers.	Coprin chevelu		prairie			✓	
Ordre : Amanitales								
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.) S.F. Gray	Amanite rougissante, Golmotte						
Ordre : Pluteales								
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer) Kummer	Plutée couleur de cerf				✓		
901	<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (de Candolle) Vizzini, Contu & Just	Volvaire visqueuse	<i>Volvariella gloiocephala</i> , <i>V. speciosa</i>				✓	
Ordre : Entolomatales								
972	<i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordeloos & Co-David	Rhodocybe tronqué	<i>Rhodocybe gemina</i>			✓		
974,5	<i>Clitocella mundula</i> (Lasch) K.L. Kluting, T.J. Baroni & Bergeman	Rhodocybe tacheté	<i>Rhodocybe mundula</i>		Spores 5,5 x 3,5 µm	✓		
Ordre : Cortinariales								
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet	Hébélome à centre foncé					✓	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Galère marginée	<i>G. autumnalis</i>			✓		
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.) Kummer	Crépidote mou				✓		
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Crépidote variable				✓		
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst) Saccardo	Crépidote à spores sphériques			Spores subglobuleuses Ø 6,5 µm	✓		
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. caspari</i> , <i>C. amygdalosporus</i>		Lames brunes ; à confirmer	✓		
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse				✓		
1301	<i>Agrocybe elatella</i> (P. Karsten) Vesterholt		<i>Agrocybe paludosa</i>	prairie	Spores 9 x 5 µm, cystides lanéigiformes 40 x 13 µm		✓	
1308	<i>Bolbitius tibubans</i> (Bulliard) Fries	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. vitellinus</i>				✓	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques	RNN	Hors
	Ordre : Russulales						
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			Chair piquante, Fe orange, Gaïac rapide bleu	✓	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i> , <i>R. undulata</i> (nom prioritaire)			✓	
1381,5	<i>Russula poikilochroa</i> Samari	Russule polychrome		chêne	Lames blanches, chapeau violacé, saveur un peu piquante, Gaïac lent et presque nul sur lames ;	✓	
1388	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.)Melzer & Zvára	Russule pâissante		bouleau	Chair très piquante		✓
1422,5	<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Kuyp. & van Vuure	Russule vert olivacé		bouleau	Gaïac + sur pied, nul sur lames, chapeau vert, lames un peu piquantes		✓
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			Gaïac faible	✓	
	Ordre : Boletales						
1611,5	<i>Paxillus ammoniavirescens</i> Contu & Dessi			saule	bord du chapeau vert à l'ammoniaque		✓
1653,7	<i>Hortiboletus engelii</i> (Hlaváček) Biketova & Wasser	Bolet commun	<i>Xerocomus communis</i>	chêne		✓	
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klof	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>	chêne		✓	
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i>			✓	