

**ANY - Association des
Naturalistes des Yvelines**



**OPIE – Office pour les
Insectes et leur Environnement**



**Sortie commune ANY78 et OPIE-IdF
du 20 juin 2026 aux mares de Vilpert,
en forêt de Rambouillet (78)**

Lieu : Mares de Vilpert, Forêt de Rambouillet (78) entre les Bréviaires et Saint-Léger en Yvelines sur la route forestière de la Billette.

Météo : ciel clair, forte température 35 °C

Les mares de Vilpert correspondent à d'anciennes carrières d'extraction de meulière qui étaient exploitées au XIXe siècle pour la construction des habitations locales. Abandonnées par l'homme, ces carrières se sont transformées en mares alimentées par les eaux de ruissellement des parcelles forestières voisines.



Crédits photo : Abigaël, Maÿlis, Sébastien, Gilles, Jean-Marc

Premières rencontres aquatiques avec le crapaud commun (*Bufo bufo*) et la grenouille verte (*Pelophylax esculentus*).




Les Odonates sont très présents avec une activité accrue par la chaleur.



L'Anax empereur (*Anax imperator*) patrouille sans se poser sur les différents étangs.

Photo non prise sur site.

Infatigable voilier, la Cordulie bronzée (*Cordulia aenea*) nous offre son plus beau sourire :



La famille des Libellulidae est bien représentée avec :

La Libellule à quatre taches, (*Libellula quadrimaculata*), espèce déterminante de l'inventaire ZNIEFF en région IdF.



La Libellule déprimée, (*Libellula depressa*).

Ici une femelle âgée bleuissante.



Le Sympetrum sanguin (*Sympetrum sanguineum*).

L'Orthétrum réticulé (*Orthetrum cancellatum*) aux ailes hyalines, mâle et cœur copulatoire.




Les Zygoptères sont principalement représentés par l'Agrion jouvencelle (*Coenagrion puella*), ici en cœur copulatoire.



Quelques nymphes au corps de feu sont présentes comme ce mâle (*Pyrrhosoma nymphula*).



Exuvie d'*Aeschna cyanea*



Exuvie, probablement de *Sympetrum*

Quelques belles observations du monde aquatique :

Hyphydrus ovatus : Ordre Coleoptera de la famille des Dytiscidae.



Famille Hydrophilidae, *Cercyon* sp.

Ordre Heteroptera de la famille des Nepidae.

Nepa cinerea, Nèpe cendré, Nèpe rousse, Scorpion d'eau, grande punaise aquatique carnivore.



La Notonecte glauque, (*Notonecta glauca*) est une punaise aquatique qui a la particularité de nager sur le dos. Ci-dessous adulte et larve.



Larve de Trichoptère.



Larve de *Rhadinoceraea micans*. Famille des Tenthredinidae
Mouche à scie. Larve sur les feuilles d'iris.



Ordre Psocodea.

Famille des Peripsocidae,
Peripsocus subfasciatus.

Classe Arachnida.
Ordre Araneae.

Pirata piraticus de la famille des Lycosidae. Elle est inféodée aux zones humides et marécageuses.



Ordre Coleoptera.

Famille Coccinellidae.

La coccinelle à damier, *Propylea-quatuordecimpunctata*, espèce aphidiphage.



Famille Lycidae.
Sous-Famille Licinae.
La Lyce à bec ou Lycie sanguine,
(*Lygistopterus sanguineus*).

Les larves vivent dans le bois mort, sous les écorces. Les adultes sont floricoles.

Le Staphylin odorant (*Ocypus olens*), espèce carnivore qui peut émettre par des glandes à l'extrémité de l'abdomen une odeur très nauséabonde pour se défendre.



Famille Brentidae, sous-famille apioninae, genre *Protapion*, probablement l'espèce *apricans*.

Ordre Heteroptera.



Oncotylus viridiflavus.



Leptopterna dolabrata.

Orthotylus tenellus.



Famille Ulopidae.
Ulopa reticulata, qui vit exclusivement sur *Calluna vulgaris*.



Ordre Lepidoptera.

Sur les berges sableuses humides, plusieurs espèces de rhopalocères Nymphalidae sont venues s'hydrater. Le Vulcain (*Vanessa atalanta*), le Paon du jour (*Aglais io*) et le petit Mars changeant (*Apatura ilia*) qui se différencie du grand Mars par une taille plus réduite et la présence d'ocelles orange à la face interne des ailes supérieures.

Forme nominale



Forme *clytie* décrite par Denis et Schiffermüller en 1775 avec ses dessins orange.

Chenille sur *Populus* sp.

Sur les ronces, la Mélitée des mélampyres (*Melitaea athalia*).



Chenille sur *Plantago* sp., *Veronica* sp.

Famille Pieridae.

Toujours aussi graphique, le citron (*Gonepteryx rahmni*) sur une fleur de Cirse.



Mimétique des Callunes, la chenille de la Noctuelle de la Myrtille (*Anarta myrtille*).

